



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/125 - DOCTORA, ME VA A ESTALLAR LA CABEZA

P. Loureiro Galán^a, A.M. Padial Baone^b y L. Muñoz Olmo^a

^aMédico Residente. Centro de Salud Ribera del Muelle. Puerto Real. Cádiz. ^bMédico de Familia. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz.

Resumen

Descripción del caso: Antecedentes personales: síndrome ansioso depresivo en tratamiento con antidepresivos y ansiolíticos. Anamnesis: paciente de 47 años con antecedentes de síndrome ansioso-depresivo, acude a urgencias por cefalea brusca holocraneal de una hora de evolución tras la ducha, sin traumatismo previo. No antecedentes de cefalea.

Exploración y pruebas complementarias: Normotensa, normocoloreada, gran afectación somática por el dolor. Glasgow 15. Auscultación cardiopulmonar normal. Exploración neurológica: lenguaje y memoria normal. PINRLA normal. Pares craneales normales. No nistagmus ni parinaud. Motricidad segmentaria de MMSS e MMII normales. Marcha normal. Ligera rigidez de nuca. TAC craneal: material hemático en espacio subaracnoideo de la cisterna supraselar. AngioTAC en polígono de Willis: sin clara evidencias de formaciones aneurismáticas ni malformaciones a nivel del polígono de Willis. Analítica: Hb 12, leucocitos 6.790, plaquetas 173. Arteriografía de encéfalo: Se coloca dispositivo de cierre percutáneo Starclose en el punto de punción. Sin alteraciones de interés en el estudio efectuado a nivel de los cuatro TC en fase arterial como en venosa.

Juicio clínico: Hemorragia subaracnoidea espontánea Fisher II.

Diagnóstico diferencial: Cefalea tensional. Crisis migrañosa. Hematoma subdural.

Comentario final: Enfermedades neurológicas más temidas por su elevada mortalidad y generación de dependencia. Existe un leve incremento en los últimos años, incremento en la incidencia a partir de los 50 años, siendo en las mujeres ligeramente superior. EL 68% de los pacientes presentan una buena situación clínica a su llegada (grados I-III de la escala Word Federation of Neurosurgeons Scale, WFNS), que implica una puntuación en la escala de coma de Glasgow entre 13 y 15. El 19% se clasificó como idiopáticas tras estudio angiográfico inicial negativo. De estas, un 40% fueron perimesencefálicas y hasta el 10% el estudio de imagen fue normal. Los pacientes con HSA perimesencefálica o con neuroimagen normal presentan recuperación completa a los 6 meses hasta en el 90%.

Bibliografía

1. Avidan A, Weissman C, Sprung CL. An internet web site as a data collection platform for multicenter research. *Anesth Analg*. 2005;100:506-11.

2. Cross DT III, Tirschwell DL, Clark MA, et al. Mortality rates after subarachnoid hemorrhage: variations according to hospital case volume in 18 states. J Neurosurg. 2003;99:810-7.

Palabras clave: Hemorragia subaracnoidea. Cefalea. Idiopático.