



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

212/3126 - NO SE ME QUITA LA FIEBRE

V. Santos Urrutia^a, M.Á. López Gil^b, J.A. Centeno Águila^c, A. Santos Urrutia^d, R. Grande Grande^e, S. Pardo del Olmo Saiz^f, M.S. Piris Santamaría^g, M.Á. Ruíz Guerra^d y E. González Cifuentes^b

^aMédico de Familia. Centro de Salud Linarejos. Jaén. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Guarromán. Jaén. ^cEnfermero. Centro de Salud Arrayanes. Linares. Jaén. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Alto Campoo. Cantabria. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Solares. Cantabria. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Camargo Interior. Cantabria. ^gMédico de Familia. Centro de Salud Cotolino. Cantabria.

Resumen

Descripción del caso: Paciente varón de 57 años de edad, fumador de un paquete diario y bebedor de 2 cervezas diarias que consulta por fiebre de predominio vespertino de tiempo de evolución de unos 6-7 meses, astenia y pérdida de peso 3-4 kg desde hace 3-4 meses. Niega cuadro catarral ni infección urinaria. No alteración del ritmo intestinal. Nicturia. Exploración normal, analítica y Rx tórax normal. Se deriva especialista.

Exploración y pruebas complementarias: Exploración: normal, no signos meníngeos, buena coloración, no adenopatías, no erupciones cutáneas, no dolor, no disnea. Auscultación normal sin ruidos añadidos. Abdomen normal, blando, depresible, sin masas ni megalias.

Juicio clínico: Neoplasia renal. Nódulo pulmonar cavitado con biopsias negativas para malignidad.

Diagnóstico diferencial: Quistes renales. Angiomiolipoma. Linfoma. Metástasis.

Comentario final: Neoplasia más frecuente en el riñón y corresponden el 2% de cánceres en adultos. La incidencia es más frecuente en países industrializados. La clínica de inicio es variada y común a distintas patologías. En sus estadios tempranos, el cáncer de riñón no provoca dolor. Los síntomas de la enfermedad suelen aparecer cuando el tumor es grande y afecta los órganos cercanos. Por eso, a veces, las personas con este tipo de cáncer no presenta ninguno síntoma. La tríada clásica del cáncer de riñón es sangre en la orina, dolor en un flanco y la aparición de una masa abdominal. A esta tríada se le conoce como la tríada demasiado tarde, la enfermedad ha avanzado más allá de un punto curativo.

Bibliografía

1. Lindblad P. Epidemiology of renal cell carcinoma. Scand J Surg. 2004;93:88-96.
2. Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol. 2007;18:581-92.
3. Gill IS, Aron M, Gervais DA, Jewett MA. Small renal mass. N Engl J Med. 2010;362:624-34.

Palabras clave: Neoplasia renal. Diagnóstico diferencial.
1138-3593 / © 2016 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.