



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 242/4853 - GRADO DE CONTROL DE LA ANTICOAGULACIÓN EN PACIENTES TRATADOS CON ACENOCUMAROL EN ATENCIÓN PRIMARIA

A. Viña Almunia<sup>a</sup>, A. Seoane Novás<sup>b</sup>, M. Bernuz Rubert<sup>a</sup>, A. Sorribes Ramírez<sup>b</sup>, A. García Lorente<sup>b</sup> e I. Pensades Sanz<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. <sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia. <sup>c</sup>Médico Residente de 1º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín Benlloch. Valencia.

### Resumen

**Objetivos:** Determinar el grado de control en de los pacientes tratados con acenocumarol asistidos en Atención Primaria.

**Metodología:** Estudio descriptivo transversal en condiciones de práctica clínica, con los pacientes que acudieron a consulta de control de anticoagulación oral en los últimos 6 meses. Patología en estudio: fibrilación auricular (FA). Recogida de datos: pacientes con controles de INR en los últimos seis meses en el Centro de Salud. Criterios de inclusión: pacientes con FA no valvular. Anticoagulados con Sintrom al menos 6 meses. Disponibilidad como mínimo de 6 controles de INR en los últimos seis meses en el Centro de Salud. Criterios de exclusión: pacientes que llevaban menos de 6 meses y/o menos de 6 controles de anticoagulación oral. Pacientes anticoagulados por patología distinta a fibrilación auricular (valvulopatías, enfermedad tromboembólica venosa, etc.). Medida de anticoagulación: INR. Variable principal: grado de control de la anticoagulación: porcentaje de pacientes en rango terapéutico. Control inadecuado de INR = valores de INR dentro de rango terapéutico < 60% en los últimos seis meses.

**Resultados:** Se calculó el tamaño muestral sobre la base de estudios previos, con un nivel de confianza del 95% y una precisión del 3%, siendo de 191 pacientes. Tamaño muestral calculado: alrededor de 160. Grado de control de la anticoagulación: en rango 51,4%, fuera de rango 48,6%. Del total fuera de rango, los pacientes con INR < 2: 20,5%, y con INR > 3 28%. En función del sexo, de los hombres presentan cifras en rango el 58,9%, mientras que las mujeres el 54,5%. En función de la edad, los < 75 años presentan el 60% de las determinaciones en rango, los pacientes de entre 75-84 años, el 53,4% están en rango y los > 84 años solo el 41% presentan las determinaciones en rango.

**Conclusiones:** Cinco de cada 10 pacientes que están en tratamiento con acenocumarol están fuera de rango. Solo un 5% de pacientes presenta todos los INR dentro de rango. El control de INR guarda una relación directa con la edad.

**Palabras clave:** Anticoagulación. Acenocumarol. Control.  
1138-3593 / © 2017 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.