



242/3549 - RIESGO SOCIOFAMILIAR EN PERSONAS INMOVILIZADAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

M. Luna Moreno^a, L. Ruíz del Moral^a, F. Hidalgo Martín^b, T. Sanz Ortega^b y J. Mancera Romero^c

^aMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.

^bMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.

^cMédico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.

Resumen

Objetivos: Analizar el riesgo sociofamiliar mediante la escala de Gijón en personas incluidas en el programa de inmovilizados de un centro de salud.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Atención Primaria. Ámbito urbano. Año 2016. Población de estudio: 393 pacientes incluidos en el programa de inmovilizados del CS. Tamaño muestral de 150. Selección mediante muestreo aleatorio sistemático. Variables: utilización de servicios sanitarios, patología crónica y nivel de dependencia. Se han empleado estadísticos descriptivos. Las variables cuantitativas se representaron con medias y desviación estándar (DE) y las cualitativas con porcentajes e intervalos de confianza (IC). Para la comparación entre grupos se utilizaron los test de la χ^2 (variables cualitativas) y el test de ANOVA (variables cuantitativas) que se ajustaban a la normalidad; en caso contrario, las variables fueron transformadas logarítmicamente. Para el análisis post-hoc se utilizó el test de Bonferroni. Se estableció un nivel de significación para una probabilidad $< 0,05$. La base de datos y los análisis estadísticos se ejecutaron sobre el programa SPSS 20 (SPSS Inc, Illinois, Estados Unidos).

Resultados: Muestra de 150 personas. 108 (72%, IC95% = 64-78) eran mujeres. Edad media (\pm DE) = 83 ± 10 (79 ± 14 en hombres y 85 ± 6 en mujeres, sin diferencias significativas). Tenían pasada la escala 91 personas (60% IC95% = 52-68), de las que 66 eran mujeres (72% IC95% = 62-80). Puntuación media (\pm DE) = 10 ± 2 puntos, con un mínimo de 5 y máximo de 16. La escala presenta 5 ítems con 5 categorías para cada uno de ellos. El punto de corte para la detección de riesgo social es 16. Presentaban riesgo social 49 personas (54% IC95% = 43-63) y tenían problema social 3 (3% IC95% = 1-9). Presentaban riesgo según la escala de Gijón 43 mujeres (65% IC95% = 53-75) y 9 hombres (36% IC95% = 20-55) con $p = 0,034$. El riesgo social no se relacionó con la utilización de servicios sanitarios, patología crónica asociada ni el nivel de dependencia.

Conclusiones: Más de la mitad de las personas inmovilizadas con la escala realizada presentaron riesgo social. Un elevado porcentaje no tenían valorado el riesgo sociofamiliar.

Palabras clave: Personas con discapacidad. Vulnerabilidad social. Atención Primaria de Salud.