



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/591 - DIFERENCIAS POR GÉNERO DE LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA CONCIENCIACIÓN SOBRE PATOLOGÍAS Y FÁRMACOS ASOCIADOS A UN MAYOR RIESGO DE ACCIDENTALIDAD POR TRÁFICO EN ANCIANOS

E. Jiménez Mejías^a, F. Ruiz Rodríguez^b, D. Molina Soberanes^c, V. Martínez Ruiz^d, L. Martín de los Reyes^c y P. Lardelli Claret^e

^aMédico de Familia. Profesor del Departamento de Medicina Preventiva. Universidad de Granada. ^bInvestigadora predoctoral. Departamento de Medicina Preventiva. Universidad de Granada. ^cInvestigador predoctoral. Departamento de Medicina Preventiva. Universidad de Granada. ^dProfesora del Departamento de Medicina Preventiva. Universidad de Granada. ^eCatedrático del Departamento de Medicina Preventiva. Universidad de Granada.

Resumen

Objetivos: Identificar y, en su caso cuantificar, las diferencias por género en la frecuencia con que los médicos de Atención Primaria indagan sobre las patologías y los fármacos más fuertemente asociados a la accidentalidad por tráfico en ancianos.

Metodología: Estudio trasversal. Fueron encuestados mediante un cuestionario 1.897 médicos de Atención Primaria de toda España, entre octubre de 2015 a noviembre de 2016. Dicho cuestionario incluye información sobre: el género y la edad del médico, el lugar de trabajo, (urbano o rural), el tipo de centro, el número de pacientes mayores de 65 años del cupo, la condición de residente y los años de experiencia laboral. Así mismo, se recoge información relacionada con la frecuencia con que el médico indaga sobre las patologías y los fármacos más fuertemente asociadas a una mayor accidentalidad por tráfico en ancianos, siendo 1 = Nunca o casi nunca y 4 = Siempre. La suma de las puntuaciones obtenidas de cada ítem sobre patologías y fármacos, nos permitió obtener los correspondientes índices que informan del grado en que la práctica del médico se adecua a las recomendaciones de las guías al respecto. Para estimar la distribución por género entre variables, se empleó el test chi cuadrado para variables categóricas y el test t de Student para variables cuantitativas.

Resultados: Un 67,8% de los encuestados fueron mujeres. Las mujeres preguntan más frecuentemente que los varones por las patologías y por el consumo de fármacos ($p < 0,001$). Las patologías para las que se obtuvieron las mayores diferencias en la frecuencia con que preguntaban siempre fueron: los trastornos depresivos (el 44,7% de las médicas vs al 35,6% de los médicos) y la HTA mal controlada (33,4% vs 25,7%). En el caso de los fármacos, las mayores diferencias las detectamos para los antitusígenos codeínicos (el 45,5% de las médicas preguntan siempre vs al 35,3% de los médicos) y los antianginosos (31,5% vs al 24,2%). Todas ellas con $p < 0,001$.

Conclusiones: La frecuencia con que los profesionales de Atención Primaria indagan sobre las patologías y los fármacos que suponen un mayor riesgo de accidente entre los ancianos, difieren en

función de su género.

Palabras clave: Conductor anciano. Tráfico Prevención de lesiones. Género del médico.