



## 242/123 - ANÁLISIS DEL USO DE LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES EN UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA

M. Villa Puente<sup>a</sup>, J. Gutiérrez Revilla<sup>b</sup>, M. Agüeros Fernández<sup>c</sup>, Á. Pérez Martín<sup>d</sup>, J. López Lanza<sup>e</sup> y J. Menchaca Riesco<sup>e</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Sardinero. Santander. Cantabria. <sup>b</sup>Farmacéutico. Gerencia de Atención Primaria. Santander. Cantabria. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Zapatón. Torrelavega. Cantabria. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Centro. Santander. Cantabria. <sup>e</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Alisal. Santander. Cantabria.

### Resumen

**Objetivos:** El uso de los nuevos anticoagulantes orales (NACOs) cada vez está más extendido, consumiendo más recursos farmacológicos. Este trabajo analiza todas las dispensaciones de NACOs realizadas en una comunidad autónoma durante un año.

**Metodología:** Análisis de todas las dispensaciones de NACOs realizadas durante el año 2016 en Cantabria (581,769 habitantes), valorando su repercusión final sobre el gasto. Se analizó rivaroxaban, apixaban, dabigatran, y edoxaban. Para calcular el consumo farmacéutico se ha utilizado el gasto, las recetas totales realizadas en este grupo y la dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes y mes (DHM) que permite comparar consumos en diferentes ámbitos. Se han utilizado porcentajes para las variables cualitativas. Los datos se han obtenido del servicio de farmacia del SCS.

**Resultados:** Los NACOs han supuesto el 3,27% del gasto total con 5.624.912,87 euros y el 95,72% del gasto utilizado en este grupo terapéutico. El orden por coste fue apixaban (44,72% y 19,93% de las recetas totales) en el puesto 9 del gasto, rivaroxaban (29,06% y 12,44% de las recetas) en el 17, dabigatran (21,634% y 9,07% de las recetas) en el 30 y edoxaban (0,3% y 0,13%) en el 542. Si comparamos con acenocumarol supuso el 4,1% y el 55,99% de las recetas (puesto 161) y warfarina el 0,16% y el 2,42% (puesto 539). La dosis/1.000 habitantes/mes (DHM) para apixaban es de 3,16 euros, para rivaroxaban de 2,43, para dabigatran de 1,69 y para edoxaban de 0,02.

**Conclusiones:** Los NACOs son fármacos cada vez más prescritos. Suponen ya más de un 3% del gasto farmacológico total y casi el 95% dentro del grupo terapéutico. El apixaban (2.628.203,01 euros), rivaroxaban (1.707.703,12 euros) y dabigatran (1.271.039,44 euros) son los más utilizados ocupando los puestos 9, 17 y 30 en el gasto total de farmacia.

**Palabras clave:** Anticoagulante. Atención Primaria. Prescripción.