



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/1856 - PERFIL CARDIOVASCULAR DE LOS PACIENTES QUE SUFREN UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO

C. Perdomo Londoño^a, J. Melero Lloret^b, L. Guillén Alcequiez^c, P. Palau Sampio^d, A. Planas del Viejo^d y A. Bellver Navarro^e

^aMédico Residente de 4º año de Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud de Borriol. Castellón.

^bMédico Residente de 5º año de Cardiología. Hospital General Universitario de Castellón. Universidad Jaume I.

Castellón. ^cMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pintor Sorolla.

Castellón. ^dAdjunta de Cardiología. Hospital General Universitario. Universitat Jaume I. Castellón. ^eAdjunto y Jefe de Cardiología. Hospital General Universitario. Universitat Jaume I. Castellón.

Resumen

Objetivos: La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todo el mundo. Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa el 31% de todas las muertes del mundo. De estos fallecimientos, 7,4 millones (el 42%) se atribuyeron a la Cardiopatía isquémica (CI). Por ello, nuestro objetivo es describir los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en una muestra que sufre un Síndrome Coronario Agudo (SCA).

Metodología: Se trata de un estudio retrospectivo transversal que se llevó a cabo en el periodo comprendido entre enero y junio de 2016 en el que se incluyen todos los SCA sometidos a Angioplastia Primaria en el Hospital General Universitario de Castellón, hospital de referencia de la Provincia de Castellón. Las variables cuantitativas se expresan con la media \pm desviación estándar y las variables discretas en forma de porcentaje. El programa estadístico utilizado fue Stata versión 13.0.

Resultados: Se incluyeron un total de 84 pacientes, siendo el 73% varones. La edad media de la muestra fue de 63 ± 12 años. La distribución por edades fue la siguiente: el 62% tenía menos de 65 años, el 26% entre 65 y 80 años y el 12% tenían más de 80 años. Respecto a los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) clásicos la distribución fue: 55% hipertensión arterial, 52% fumadores activos (10% de exfumadores), 48% dislipémicos, 28% diabéticos y 18% obesos. El 7% de los pacientes presentaba cardiopatía isquémica previa. En este registro, cabe destacar que en el 38% de los pacientes no se registraba en los antecedentes si presentaba Obesidad, a pesar de ser un FRCV bien conocido. El 35% de los pacientes presentaban más de 3 FRCV.

Conclusiones: El 35% de nuestra muestra presentaba alto riesgo cardiovascular, por lo que se debería de intensificar las campañas de prevención, tanto primaria para evitar nuevos eventos, como secundaria.

Palabras clave: Factor de riesgo cardiovascular.