



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 242/4801 - EXAMEN DE PAPANICOLAOU EN PACIENTES QUE CONSULTARON EN LA UNIDAD DE SALUD MARÍA AUXILIADORA, DICIEMBRE 2016 A MAYO 2017

N. Araujo González<sup>a</sup>, C. Barboza Lisboa<sup>b</sup> y C. Fernández Leguizamón<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Obstetra. Unidad de Salud de la Familia. X Región Sanitaria. Paraguay. <sup>b</sup>Médico de Familia. USF María Auxiliadora. X Región Sanitaria. Paraguay. <sup>c</sup>Médico de Familia. Unidad de Salud de la Familia. X Región Sanitaria. Paraguay.

### Resumen

**Objetivos:** Describir los hallazgos previos y actuales de pacientes que acudieron a realizar Papanicolaou en la Unidad de Salud Familiar (USF) María Auxiliadora, Presidente Franco, Alto Paraná.

**Metodología:** Se llevó a cabo un estudio descriptivo longitudinal. Se incluyeron pacientes mayores de 15 años que acudieron a la Unidad de Salud Familiar “María Auxiliadora” del Distrito de Presidente Franco, Paraguay, en el periodo de diciembre 2016 a mayo 2017. Se confeccionó un cuestionario conteniendo variables demográficas, antecedentes obstétricos, estudios anteriores de PAP, métodos anticonceptivos y resultados de PAP actuales. Los datos fueron cargados en Excel y analizados en programa Epi Info 7.

**Resultados:** Fueron estudiados un total de 87 mujeres, con promedio de edad  $32,5 \pm 11,6$ ; el 28,7 menores de 25 años. Según antecedentes de gesta: 21,8% nuligestas, 59,4% 1-3, 17,2%  $\geq 4$  gestas. El 16,1% en estado de gravidez. Antecedentes de estudios de PAP: a nivel general el 23% nunca se realizaron, del grupo de  $\geq 25$  años el 14,5%, de los cuales el 52,8% se realizaron hace  $\geq 2$  años. El 45,8% con método anticonceptivo hormonal, el 8% DIU, otros 9,1%. Los estudios PAP arrojaron 1 caso con ASCUS, del grupo con resultados negativos: el 47,6 presentaron procesos inflamatorios con presencia de ITS (Gardnerella, Candida sp. y Trichomonas sp.).

**Conclusiones:** El Papanicolaou sigue siendo el método más eficaz y económico para detectar alteraciones del cuello uterino o lesiones preneoplásicas, Es importante realizar el examen de PAP y comunicar a nuestras pacientes el resultado del mismo, insistir en su realización anual dando seguimiento y respuesta a las alteraciones que puedan presentarse y un referencia oportuna de aquellas que requieran procedimientos y evaluaciones en niveles superiores.

**Palabras clave:** Prueba de Papanicolaou. Atención Primaria de Salud. Paraguay. (DeCS).