



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/2550 - CUANDO ANTICOAGULAR NO ES FÁCIL

M. Javaloyes Martínez^a, J. Martínez Elvira^b, N. Fernández Brufal^c, C. Herrero Payo^d, G. Cascales Herrero^a y M. Martínez Vergara^c

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Pola. Alicante. ^bCardiólogo. Hospital Vega Baja. Orihuela. Alicante. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Santa Pola. Alicante. ^dMédico Residente de 1er año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Santa Pola. Alicante.

Resumen

Descripción del caso: Paciente de 55 años de edad DM tipo 2, cirrosis hepática por VHC y fumador. En abril de 2017 ingreso en Medicina Digestiva por hemorragia digestiva alta secundaria a ulcus duodenal. Una semana tras el alta el paciente presentó SCASEST con necesidad de implante de stents farmacoactivos en oclusión de descendente anterior proximal y estenosis severa de coronaria derecha proximal, decidiéndose al alta doble antiagregación únicamente durante un mes por alto riesgo de sangrado. Acude a nuestra consulta en junio para control evolutivo y nos comenta una discreta disnea de esfuerzo de 4 días de evolución sin otros síntomas.

Exploración y pruebas complementarias: Auscultación cardíaca: tonos arrítmicos, soplo sistólico en ápex I/VI. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, no roncus ni crepitantes. Miembros inferiores sin edemas ni signos de TVP. ECG: FA a 90 lpm, eje 60°, T negativas de V1-V4. Analítica sanguínea: Cr 0,49 mg/dl, LDL 71 mg/dl, Hb 10,6 g/l, IQuick 91%. Gastroscopia: ulcus duodenal en resolución de 8 mm de diámetro.

Juicio clínico: 1. Fibrilación auricular en paciente de muy alto riesgo hemorrágico. 2. Hemorragia digestiva alta secundaria a ulcus duodenal. 3. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST.

Diagnóstico diferencial: En un paciente con cardiopatía isquémica y cambios en su clase funcional debemos descartar empeoramiento de la función sistólica, aparición de arritmias, así como otros procesos no cardiológicos como puede ser la anemia.

Comentario final: Ante paciente con indicación de anticoagulación se consulta el caso con Medicina Digestiva que decide realizar segunda endoscopia y se inicia tratamiento erradicador frente Helicobacter pylori con amoxicilina, claritromicina, omeprazol y metronidazol. A la hora de iniciar tratamiento anticoagulante se opta, tras comentar con farmacéutico hospitalario, por edoxabán 30 mg mientras esté con tratamiento erradicador y posteriormente a dosis de 60 mg de manera crónica, remitiendo al paciente a consultas de Cardiología para seguimiento.

Bibliografía

1. Guía ESC 2016 sobre el diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, desarrollada en

colaboración con la EACTS. Rev Esp Cardiol. 2017;70(1):50.e1-e84.

Palabras clave: Fibrilación auricular. Hemorragia digestiva. Anticoagulación.