



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/2299 - EXPERIENCIA CON INHIBIDORES DEL COTRANSPORTADOR RENAL SODIO GLUCOSA TIPO 2 (GLUCOSÚRICOS) EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2 (DM2)

M. Ronceros Vidal^a, R. Gutiérrez Ruiz^b, A. Barona Alcalde^c, J. Zampaña Quintero^d, M. Alonso Pino^e y A. Expósito Mateo^f

^aMédico de Familia. Centro de Salud Ribera del Muelle. Puerto Real. Cádiz. ^bMédico de Familia. Centro de Salud La Atalaya. Conil de la Frontera. Cádiz. ^cMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ribera del Muelle. Puerto Real. Cádiz. ^dMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Doctor Federico Rubio. El Puerto de Santa María. Cádiz. ^eMédico de Familia. Hospital Universitario de Puerto Real. Cádiz. ^fMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pinillo Chico. El Puerto de Santa María. Cádiz.

Resumen

Objetivos: Analizar la eficacia de los Glucosúricos con respecto al efecto hipoglucemiante y baja de peso, con datos reales de pacientes DM2 tratados con dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina.

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en Centro de Salud "La Atalaya" Conil-Cádiz. Se revisó historias clínicas digitalizadas de pacientes diagnosticados de DM2 y que tuvieron como tratamiento un fármaco de la familia de los Glucosúricos entre 01/06/2015 y el 01/04/2017. Se recogieron datos como edad, sexo, peso, HbA1c al momento de iniciar el tratamiento y en los controles sucesivos entre 3 y 6 meses después.

Resultados: Se analizaron los datos de 35 pacientes (19 hombres (46%) y 26 mujeres (54%)), edad media de 64 años \pm DE 11,05, rango (46-70). De estos el 15% se trataron con canagliflozina, el 29% con empagliflozina y el 54% con dapagliflozina. La duración media el tratamiento fueron 7,7 meses \pm DE 11,02. Descenso de la HbA1c del 80% de los pacientes y fracaso del tratamiento en un 20%. El descenso medio fue de 1,8% con un rango entre 4,7-0,2%. La disminución de peso se presentó en el mismo porcentaje y 2,31 Kg \pm DE 2,1.

Conclusiones: En pacientes con DM2, los glucosúricos, presentan una eficacia manifiesta tanto para el control glucémico como para el de peso. Los datos demuestran resultados similares a los ofrecidos en ficha técnica de cada uno de los fármacos. Debemos destacar que existe una variabilidad muy grande entre individuos en cuanto a la eficacia de estos fármacos.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2. Glucosúricos. SGLT2.