



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

242/4991 - INCIDENCIA DE DIABETES GESTACIONAL EN EXTREMADURA

A. Barquilla García^a, J. Sánchez Vega^b, F. Buitrago Ramírez^c, J. Romero Vigará^d, M. Carretero Villanueva^a y S. García Espada^e

^aMédico de Familia. EAP de Trujillo. Cáceres. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Talavera la Real. Badajoz.

^cMédico de Familia. Centro de Salud La Paz. Badajoz. ^dMédico de Familia. Centro de Salud de Pueblonuevo del Guadiana. Badajoz. ^eMédico Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. EAP San Roque. Badajoz.

Resumen

Objetivos: Determinar la incidencia de diabetes gestacional en Extremadura.

Metodología: Utilizamos el CMBD de partos que tuvieron lugar en los hospitales públicos de Extremadura durante los años 2010 a 2015. El CMBD contiene datos sobre la fecha de nacimiento, el periodo de ingreso y los diagnósticos secundarios incluyendo diabetes y diabetes gestacional.

Resultados: Durante los seis años analizados se produjeron en Extremadura 52.898 partos (2010: 9.602; 2011: 9.453; 2012: 9.028; 2013: 8.175; 2014: 8.419; 2015: 8.221). 31262 (59%) en mayores de 30 años. Tenían diagnóstico previo de diabetes 305 mujeres (0,6% de los partos). Fueron diagnosticadas de DMG 1.953 mujeres (3,7% de los partos). En > 40 años 160 casos en 1.489 partos (10,7%); 36-40 (542 de 9.915; 5,5%); 31-35 (747 de 19.822; 3,8%); 26-30 (398 de 13.519; 2,9%); 21-25 (85 de 5.736; 1,5%), y ≤ 20 (21 de 2.417; 0,9%).

Conclusiones: El número de partos disminuye cada año en Extremadura. El 59% tienen lugar en mujeres mayores de 30 años. Los embarazos en mujeres con diabetes son muy poco frecuentes. La diabetes gestacional se diagnostica en el 3,7% de los embarazos de manera estable en los últimos años y es más frecuente cuanto más edad tenga la embarazada.

Palabras clave: Diabetes. Diabetes gestacional. Extremadura.