



## 242/2003 - OPTIMIZANDO EL DIAGNÓSTICO DE FARINGOAMIGDALITIS BACTERIANA

F. Panadero Riesco<sup>a</sup>, S. Aldaz Vaca<sup>a</sup>, N. Rivero Sánchez<sup>b</sup>, M. Flor Montalvo<sup>c</sup> y D. Largo Rodríguez<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Joaquín Elizalde. Logroño. La Rioja.

<sup>b</sup>Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Gamonal Antigua. Burgos. <sup>c</sup>Médico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Gonzalo de Berceo. Logroño. La Rioja.

### Resumen

**Descripción del caso:** Mujer de 70 años con antecedente de DM tipo 2 en tratamiento, que acude por odinofagia, tos seca y congestión de 3-4 días de evolución que comenzó con rinorrea, otalgia, malestar y cefalea. Niega fiebre. Tenía amoxicilina/clavulánico en casa y ha empezado a tomarlo, sin mejoría alguna.

**Exploración y pruebas complementarias:** No adenopatías laterocervicales. Orofaringe: eritematosa con moco en cavum, pilares edematizados, amígdalas eutróficas sin exudados. Otoscopia bilateral: Normal. ACP: normal.

**Juicio clínico:** Faringitis, probablemente vírica.

**Diagnóstico diferencial:** Amigdalitis pultácea, monucleosis infecciosa, tos crónica, goteo posnasal, ERGE...

**Comentario final:** El dolor de garganta es un motivo frecuente de consulta. El 14% de la patología infecciosa que vemos en primaria se corresponde a las faringitis, de las que solamente el 5-15% son de origen estreptocócico. Para la orientación clínico-etiológica, tendemos a recurrir únicamente a los criterios clínicos de Centor: fiebre > 38 °C, adenopatías, exudados y ausencia de tos. El inconveniente mayor es que aun con los 4 criterios la probabilidad clínica de infección estreptocócica es del 53%, lo cual podría resolverse con el test de detección rápida de Ag de SBHA aumentando el VPP al 83%. Dicho test es recomendable en caso de disponer de 3-4 criterios. En ausencia de esto no está indicado ni dicha prueba ni tratamiento antibiótico. En aquellos casos con 3-4 criterios clínicos, y sobre todo, si tenemos un test positivo, está indicado el tratamiento con antibiótico, siendo de elección la fenoximetilpenicilina o penicilina G.

### Bibliografía

1. Villa Estébanez R, Veiras del Río O. Dolor de garganta: ¿Tiene una amigdalitis bacteriana? AMF. 2013;9(8):457-60.
2. Problemas de la cara, nariz, boca, garganta y oídos. AMF. 2016;12(5):241-312.
3. Guía clínica de Faringitis aguda. Fisterra.com. 2016.

**Palabras clave:** Faringitis. Odinofagia.