



## 242/1049 - ECOGRAFÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA UNA PRIORIDAD PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS LESIONES DE PARTES BLANDAS

J. Bravo Corrales, F. Cuevas Merino, C. Carreres Molas, R. Flores Cebrià, N. Sáenz Moya y M. Moruno Carrizosa

Médico de Familia. Centre d'Atenció Primària Bellvitge Sud. L'Hospitalet de Llobregat.

### Resumen

**Descripción del caso:** Paciente mujer de 31 años de edad sin antecedentes patológicos de interés que consulta por tumoración postraumática en muslo derecho de unos 45 días de evolución.

**Exploración y pruebas complementarias:** A la exploración física se aprecia en la cara anterior y distal del muslo derecho una tumoración de unos 5 cm blanda con cambios de coloración en la piel sugestivos de hematoma evolucionado. No se aprecian signos inflamatorios perilesionales y el balance articular pasivo y activo de rodilla y cadera están conservados. Se solicita ecografía preferente de partes blandas realizada en el servicio de Radiología en la que se aprecia área hiperecogénica en la grasa subcutánea, en relación a cambios contusionales y colección líquida fluida subyacente al área de contusión grasa, que indican un colección por contusión-cizallamiento, correspondiente con lesión de Morel-Lavallée de 6 × 5 × 1 cm.

**Juicio clínico:** La lesión de Morel-Lavallée es una enfermedad infrecuente, provocada habitualmente por traumatismos directos, caracterizada por la creación de una cavidad entre el tejido subcutáneo y la fascia muscular. Es más habitual en mujeres y suele aparecer días después del trauma inicial aunque en ocasiones puede aparecer meses después provocando complicaciones como infecciones o necrosis cutáneas, por ello es fundamental el diagnóstico precoz para poder establecer el tratamiento oportuno. Inicialmente se optará por un tratamiento conservador con vendaje compresivo o drenaje por succión, aunque en algunos casos debe ser agresivo con desbridamiento del tejido afectado. En nuestro caso se optó por el tratamiento conservador remitiendo de forma progresiva.

**Diagnóstico diferencial:** Enfermedades que cursan con necrosis cutánea. Hematoma por trastorno de la coagulación. Sarcomas de partes blandas. Linfocele.

**Comentario final:** La ecografía es el método ideal para realizar el diagnóstico precoz y nos ayudará con el diferencial. Disponer de ecógrafos y de médicos de familia formados en una técnica inocua, barata, económica, accesible, rápida, repetible y resolutive es una necesidad en el futuro de nuestra especialidad que mejorará la atención a los pacientes y la satisfacción de los profesionales.

### Bibliografía

1. Pablo Márquez B, et al. Seroma de Morel-Lavallée. Semergen. 2014;40:350-1.

2. Muniesa Montserrat C, et al. Diagnóstico de la necrosis cutánea. Semin Fund Esp Reumatol. 2008;9:86-95.
3. Díaz Rodríguez N. La ecografía en Atención Primaria. Semergen. 2002;28(7):376-84.

**Palabras clave:** Ecografía. Morel-Lavallée. Diagnóstico precoz.