



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

## 242/1287 - SÍNDROME DE LAS CRECEDERAS

E. Mediavilla Oteiza<sup>a</sup>, N. Rezola Merino<sup>b</sup>, U. García Azcarate<sup>a</sup>, C. Martínez Esquiroz<sup>c</sup>, M. Girona Martínez<sup>d</sup> y M. Chouza Sanín<sup>e</sup>

<sup>a</sup>Médico Residente de 3<sup>er</sup> año de Medicina de Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Chantrea del Complejo Hospitalario de Navarra. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Huarte. Pamplona. Navarra. <sup>c</sup>Médico Residente de 3<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Mendillorri del Complejo Hospitalario de Navarra. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Mutilva. Pamplona. <sup>e</sup>Anestesia y reanimación. Complejo hospitalario Navarra. Pamplona.

### Resumen

**Descripción del caso:** Paciente varón de 22 años. Antecedentes personales de tabaquismo, obesidad e inmigrante de Brasil. Acude a consulta por gonalgia derecha súbita continua, de cuatro días de evolución, que ha ido progresando hasta provocar imposibilidad para la deambulación y flexión de la pierna. Respuesta parcial a AINEs. No recuerda traumatismo ni movimientos previos dolorosos. Vida poco activa.

**Exploración y pruebas complementarias:** Estable. Afebril. Deambulación tórpidas con apoyos. No disimetrías. Rotación interna y externa de cadera normal. Flexoextensión de cadera normal. Leve derrame articular. Dolor a la palpación de tuberosidad tibial. Dolor y limitación con la flexión forzada. Cajones negativos. Bostezos negativos. Maniobras meniscales ligeramente dolorosas. Bamboleo rotuliano ligero y doloroso. No dolor a la palpación de interlíneas articulares. Se palpan pulsos periféricos simétricos. No aumento de tamaño, no calor, no hematoma. Palpación muscular anodina. Rx de rodilla: despegamiento del cartílago de crecimiento ya calcificado, en zona de tuberosidad tibial anterior. Espacio interarticular conservado. Rótula íntegra. No fracturas a otros niveles.

**Juicio clínico:** Síndrome de las crecederas. Enfermedad de Osgood-Schlatter.

**Diagnóstico diferencial:** Fractura o microfractura de tibia, bursitis infrapatelar, osteocondritis disecante, enfermedad de Larsen Sindeng, síndrome femoropatelar, lesión fisaria traumática de la tuberosidad tibial, tumores de tibia, lesión meniscal...

**Comentario final:** La base de la atención primaria es la realización de una buena historia clínica y exploración del paciente. Esta enfermedad se basa en un diagnóstico clínico. Las pruebas complementarias pueden solicitarse para confirmar el diagnóstico y descartar otros con un posible manejo más especializado en el caso de que el paciente no mejore con el tratamiento propuesto, abaratando costes y efectos secundarios indeseados para el paciente.

### Bibliografía

1. Osgood RB. Lesions of the tibia tubercle occurring during adolescence. Boston Medical and

Surgical Journal. 1903;148:114-7.

2. Chacón-Pizano WL, Mejía-Rodríguez O, Antonio-Valdiviezo A. Enfermedad de Osgood-Schlatter. Aten Fam. 2013;20(3):96-7.

**Palabras clave:** Enfermedad de Osgood-Schlatter. Síndrome de las crecederas.