



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/1310 - VARIABILIDAD DE LOS NIVELES DE VITAMINA D EN NUESTROS PACIENTES MAYORES DE 65 AÑOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

L. Flores Olmos^a, B. Muñoz Díaz^b, M. Guzmán Quesada^c, M. Lobo Marín^d, H. Sánchez Claros^e, M. Ibarra Rodríguez^f, J. Martínez de la Iglesia^g y J. Redondo Sánchez^g

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lucano. Córdoba. ^bMédico de Familia. UGC La Sierra. Córdoba. ^cMédico Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lucano. Córdoba. ^dMédico Residente de 4^o años de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lucano. Córdoba. ^eMédico Residente de 2^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lucano. Córdoba. ^fMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lucano. Córdoba. ^gMédico de Familia. Centro de Salud Lucano. Córdoba.

Resumen

Objetivos: Analizar los niveles de vitamina D3 en aquellos pacientes mayores de 65 años que viven en domicilio y pacientes que viven en residencia, estableciendo posibles factores asociados.

Metodología: Estudio observacional y transversal donde se seleccionó una muestra de 255 pacientes (pacientes que acudían a la consulta (9,3%), en programa de atención domiciliaria (48,8%) y pacientes institucionalizados (41,9%)) de dos centros de salud urbano y uno rural (IC95% y precisión ± 4). Se determinó los niveles de vitamina D y se recogieron 45 variables socio-demográficas y de salud. A todos ellos se les realizó una valoración geriátrica integral. Se realizaron estadísticos descriptivos y se analizaron asociaciones mediante la aplicación de chi cuadrado y análisis de la varianza (ANOVA), con una significación de $p < 0,005$. Variables: edad, sexo, número de enfermedades, índice de Barthel, cuestionario MNA, suplementación de vitamina D, modo de asistencia sanitaria, grado de movilidad, método Chang.

Resultados: De los 228 pacientes, 166 (72,8%) eran mujeres. El 50,4% vivían en residencia. La media de edad era de 81,52 años. Conforme aumenta la edad aumenta el porcentaje de pacientes con vitamina D baja (8,6% los pacientes que tienen entre 65-75 años, 22,9% los pacientes que tienen 75-85 años y el 25% mayores de 85 años). Además se ha asociado a mayor riesgo de déficit de vitamina D los pacientes: que están institucionalizados ($p < 0,001$), la no toma de suplemento de vitamina D ($p < 0,035$), índice Barthel con dependencia grave ($p < 0,000$) y pacientes con desnutrición medido por el cuestionario MNA ($p < 0,001$).

Conclusiones: El mantenimiento de niveles de vitamina D normales disminuye el riesgo cardiovascular, de caídas y por tanto de fracturas. La toma de suplementos de vitamina D es baja (18,4% de los pacientes del estudio), por lo tanto habría que aumentar la prescripción de esta vitamina en pacientes con mayor probabilidad de déficit.

Palabras clave: Vitamina D. Anciano.

1138-3593 / © 2018 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.