



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/40 - ¿USAMOS MÁS LOS NUEVOS ANTICOAGULANTES ORALES?

Á. Pérez Martín^a, M. Agüeros Fernández^b, J. Gutiérrez Revilla^c, J. Bustamante Odriozola^d, J. López Lanza^e, M. Gago Bustamante^f, A. Avellaneda Fernández^g, C. Traspuesto Pascual^h, A. Alonso Gonzálezⁱ y M. Villa Puenteⁱ

^aMédico de Familia. Centro de Salud Centro. Santander. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Zapatón. Santander. ^cFarmacéutico. GAP de Santander. ^dMédico Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Centro. Santander. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Vargas. Santander. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Zapatón. Cantabria. ^gMédico de Familia. Centro de Salud Los Cármenes. Madrid. ^hDUE. Centro de Salud Centro. Santander. ⁱMédico de Familia. Centro de Salud Sardinero. Santander.

Resumen

Objetivos: Los nuevos anticoagulantes orales (NACOs) cada vez se usan más, consumiendo más recursos farmacológicos. Se analizan todas las dispensaciones de NACOs realizadas en una comunidad autónoma durante un año y su evolución con respecto al anterior.

Metodología: Estudio de todas las dispensaciones de anticoagulantes orales (ACO) realizadas durante el año 2017 en Cantabria (581.109 habitantes), valorando su repercusión final sobre el gasto y evolución con el 2016. Se analizó rivaroxaban, apixaban, dabigatran, edoxaban, acenocumarol y warfarina. Para calcular el consumo farmacéutico se ha utilizado el gasto, las recetas totales realizadas en este grupo y la dosis diaria definida por cada 1.000 habitantes y mes (DHM) que permite comparar consumos en diferentes ámbitos. Los datos se han obtenido del servicio de farmacia del SCS.

Resultados: Los ACO han supuesto el 4,35% del gasto total con 7.690.332 euros siendo el 8^o grupo terapéutico en gasto (NACOs el 97%). El orden por coste fue apixaban (48,3% y 26,3% de las recetas totales) en el puesto 2 del gasto, rivaroxaban (25,4% y 12,9%) en el 14, dabigatran (17,8% y 8,9%) en el 26 y edoxaban (5,4% y 2,8%) en el 119. Si comparamos con acenocumarol supuso el 2,8% y el 46,6% de las recetas (puesto 191) y warfarina el 0,1% y el 2,26% (puesto 676). La dosis/1.000 habitantes/mes (DHM) para apixaban es de 136,7, para rivaroxaban 85, para dabigatran 55,8, para edoxaban de 17,2, para acenocumarol 198,1 y para warfarina 8,24. El incremento con respecto al 2016 en recetas para apixaban fue de 6,4%, para rivaroxaban 0,43, para dabigatran -0,17, para edoxaban 2,6, para acenocumarol -9,3 y para warfarina -0,1.

Conclusiones: Existe un aumento en el uso de NACOs, suponiendo más del 4% del gasto farmacológico total y casi el 95% dentro del grupo terapéutico. El apixaban (3.716.870 euros), rivaroxaban (1.956.687 euros) y dabigatran (1.371.469 euros) son los más utilizados ocupando los puestos 2, 14 y 26 en el gasto total de farmacia. Existe un decrecimiento en el uso de acenocumarol.

Palabras clave: Anticoagulante. Atención Primaria. Prescripción.