



# Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



## 347/1824 - SÍNDROME DE TAKO-TSUBO... ¿QUIÉN ME VA A CURAR EL CORAZÓN PARTÍO?

R. Sendino del Olmo<sup>a</sup>, M. Pinel Monge<sup>b</sup>, A. Delgado Yáñez<sup>c</sup> y E. Zorrilla Amirold<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Aranbizkarra 1. Álava. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud La Habana-Cuba. Álava. <sup>c</sup>Médico Residente de 4<sup>o</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Habana-Cuba. Vitoria-Gasteiz. <sup>d</sup>Médico Residente de 1<sup>er</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Araba. Vitoria-Gasteiz.

### Resumen

**Descripción del caso:** Mujer de 82 años acude a urgencias por mareo, náuseas y síncope con relajación de esfínteres. Refiere situación de estrés emocional por fallecimiento de su marido hace 1 mes. AP; HTA. Dislipemia. Ingresos en cardiología por síncope vasovagales, con eco cardiografía y eco en TSA sin hallazgos significativos. Trastorno adaptativo con ansiedad. Tratamiento; enalapril/hctz 20/12,5 mg 1/24h.

**Exploración y pruebas complementarias:** TA 116/74 65 lpm. Ac; rítmica soplo sistólico. Ap; crepitantes finas base izquierda. EKG; rs 76 lpm. T negativas profundas y generalizadas de V2-V6 y en cara inferior. Analítica; destacamos TNL ultrasensible; 2515, BNP; 500. Se administra AAS 250 mg y clopidogrel 600 mg. ETT; VI no dilatado con ligera HVI. Acinesia/discinesia de los segmentos apicales y acinesia parcial de los segmentos medios. Patrón de alteración de la relajación con criterios de disfunción diastólica. Coronariografía; sin lesiones significativas. RM; sugiere miocardiopatía Tako-tsubo; acinesia/discinesia de los segmentos apicales. Durante el ingreso en cardiología se mantiene asintomática monitorizada por prolongación de QT, sin arritmias ventriculares con normalización posterior de QT.

**Orientación diagnóstica:** Síndrome Tako-tsubo.

**Diagnóstico diferencial:** Síndrome coronario agudo.

**Comentario final:** El síndrome de Tako-tsubo es una miocardiopatía aguda, reversible, capaz de producir los mismos síntomas que un infarto, con elevación de biomarcadores y alteraciones electrocardiográficas isquémicas. La presencia de arterias coronarias sin obstrucciones significativas y la forma típica en la ventriculografía, junto con la ulterior recuperación total del ventrículo apoyan el diagnóstico. Se observa generalmente en mujeres posmenopáusicas y es frecuente la presencia de una situación estresante, tanto física como emocional. El tratamiento, empíricamente, es similar al del infarto agudo de miocardio, con especial atención en la introducción de betabloqueantes y anticoagulación.

### Bibliografía

1. Sato H, Tateishi H, Uchida T. Takotsubo-type cardiomyopathy due to multivessel spasm. En: Kodama K, Haze K, Hon M, eds. *Clinical Aspect of Myocardial Injury: From Ischemia to Heart Failure*. Tokyo: Kagakuhyouronsya Co; 1990. p. 56-64.
2. Nunez-Gil IJ, Fernández-Ortiz A, Luaces Mendez M, et al. Apical transient dyskinesia (TakoTsubo cardiomyopathy): a five-year clinical experience in Caucasians. *Eur Heart J* 2008;29(abstract supplement):53.

**Palabras clave:** Síndrome de Tako-tsubo.