



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 347/2908 - PIGMENTACIÓN UNGUEAL EN MUJER DE RAZA BLANCA

S. Lagares Abreu<sup>a</sup>, A. Lorenzo Valdez<sup>b</sup>, W. Reynoso Heinsen<sup>c</sup> y J. Grande Saurina<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Fuensalida. Consultorio Portillo. Toledo. <sup>b</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Santa Cruz de la Zarza. Toledo. <sup>c</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Mora. Toledo. <sup>d</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Fuensalida. Toledo.

### Resumen

**Objetivos:** Revisar los tipos de pigmentaciones ungueales. Pensar en otras patologías ungueales y no solo en las fúngicas.

**Metodología:** Caso clínico: mujer de raza blanca, 43 años de edad, Sin antecedentes patológicos de interés, ni tratamiento farmacológico, que acude a consulta por cambio de coloración en uña de primer dedo pie derecho desde hace 9 meses aproximadamente; objetiva línea vertical oscura, además la refiere algo amarillenta, no refiere dolor, ni trauma previo. Exploración física y pruebas complementarias; pie derecho: primer dedo, uña algo amarillenta discreta rugosidad, línea vertical negruzca con banda central más oscura uniforme, no dolor, no secreción. Resto de uñas y pie izquierdo normales.

**Resultados:** Pauto amorolfina dos veces por semana. Realizo foto de la lesión y envió imagen a Dermatología (02/03/2017) vía intranet. 14/03/2017. Citan de manera presencial a la paciente. 07/04/2017. Biopsian la lesión. 05/2017. Resultado nevus melanocítico. 2018. permanece en revisiones, vigilancia. Orientación diagnóstica: melanoniquia longitudinal. Diagnóstico diferencial: nevus melanocítico, tumores ungueales, hematoma subungueal, infecciones ungueales.

**Conclusiones:** La melanoniquia es una pigmentación de las uñas con tonalidades que van del café claro al negro, secundaria al depósito de melanina en la lámina ungueal. El pigmento puede proceder de fuentes exógenas o endógenas y abarcar toda la lámina ungueal, una porción de la misma de manera transversal o con más frecuencia como bandas longitudinales. La melanoniquia puede ser un signo temprano de melanoma ungueal, por lo cual el abordaje adecuado es de gran relevancia. Auxiliares diagnósticos como la dermatoscopia y el estudio histopatológico son útiles para precisar la etiología y el tipo de tratamiento.

### Bibliografía

1. Serrano S, Fernández Pugnaire MA, Serrano C. Guía de dermoscopia. Madrid: Aula Médica; 2006.
2. Haneke E, Baran R. Longitudinal melanonychia. Dermatol Surg. 2001;27:580-4.

**Palabras clave:** Melanoniquia. Melanoma. Nevus. Signos de Hutchinson.

1138-3593 / © 2018 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.