



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/2501 - DEPRESIÓN Y ANSIEDAD EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

M. García Marrero^a, A. Mulero García^b y F. Cuevas Fernández^a

^aMédico de Familia. Centro de Salud de Barranco Grande. Santa Cruz de Tenerife. ^bGraduada en Medicina. Universidad La Laguna. Santa Cruz de Tenerife.

Resumen

Objetivos: Evaluar la presencia de sintomatología ansioso-depresiva en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y la percepción subjetiva de los pacientes sobre la influencia de los acontecimientos vitales estresantes (AVE) y otros factores en su enfermedad, así como la interferencia en su actividad diaria.

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Se captaron de forma oportunista pacientes de un Centro de Salud con diagnóstico de EII. Mediante revisión de historias clínicas y entrevista personal, se registraron variables sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, estudios, convivencia, actividad laboral) y clínicas: a) características EII, edad al inicio de síntomas y diagnóstico, duración, número de brotes, tiempo desde último brote, tratamiento farmacológico actual; b) antecedentes personales, comorbilidad, tóxicos, actividad física; c) antecedente ansiedad/depresión, presencia de síntomas de depresión y/o ansiedad mediante escala de Goldberg, tratamiento psicofarmacológico actual, percepción de pacientes sobre la relación entre AVE y evolución de la enfermedad e interferencia de EII en su actividad diaria. Análisis estadístico: univariante utilizando medidas de tendencia central o frecuencias; bivariante mediante t-Student o chi-cuadrado según el caso, aplicando SPSS 22.0.

Resultados: N = 38; 50% mujeres, edad $46,5 \pm 13$, 65,8% casadas, 71,1% convivían con pareja y/o hijos, 73,6% estudios primarios/secundarios y 63,2% activo laboralmente. EII: 55,3% enfermedad Crohn, 44,7% colitis ulcerosa. 39,5%. Edad inicio de síntomas $32,8 \pm 14$ y diagnóstico $34,95 \pm 14$ años. Duración de enfermedad $13,76 \pm 8$ años, $5,45 \pm 6,4$ brotes, tiempo desde último brote $37,05 \pm 52,62$ meses; 15,8% presenta sintomatología actual; 15,8% no tratamiento. El 39,5% presenta ansiedad y 34,2% depresión actual. Análisis bivariante: se asoció sintomatología ansioso-depresiva con mayor duración, mayor número de brotes y edad más temprana de inicio/diagnóstico de EII. El antecedente de depresión se correlacionó con aumento de ansiedad/depresión y el tratamiento antidepressivo se correlacionó con menos ansiedad. Según los pacientes la enfermedad influye en el inicio de la enfermedad, aumento de síntomas y recaídas.

Conclusiones: Existe una alta prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con EII. Debería integrarse de manera sistemática el despistaje y manejo de la ansiedad y depresión, ya que su control puede mejorar la evolución de la enfermedad.

Palabras clave: Enfermedad Inflamatoria intestinal. Ansiedad. Depresión.
1138-3593 / © 2018 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.