



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/1942 - REPORTE DE CASO DE MORDEDURA CANINA

A. Benítez Olmedo^a, L. Esquivel Martínez^b, L. Peña Mercado^c y A. Cusihamán Puma^d

^aMédico Residente de 1^{er} año de Medicina Familiar. Sanatorio Adventista de Asunción. Paraguay. ^bMédico Residente de 2^o año de Medicina Familiar. Sanatorio Adventista de Asunción. Paraguay. ^cMédico Residente de 2^o año de Medicina Familiar y Comunitaria. Sanatorio Adventista de Asunción. Paraguay. ^dMédico de Familia. Dirección de Educación e Investigación de la Dirección General de APS. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Paraguay.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 64 años, conocida portadora de hipotiroidismo secundario en tratamiento y vitíligo, consultó por heridas de tipo incisa en cuello y heridas simples en tórax anterior producto de un ataque sin causa aparente de un perro desconocido en la vía pública de 2 horas de evolución.

Exploración y pruebas complementarias: Lesiones incisivas a nivel de la región del cuello y del tórax anterior con signos cardinales de rubor y dolor locales.

Orientación diagnóstica: Mordedura canina.

Diagnóstico diferencial: Mordedura por otro tipo de animales.

Comentario final: La importancia de conocer el manejo preventivo de la rabia para la salud pública, no radica solo en el número de casos, sino en la profilaxis oportuna aplicada, siendo el único medio disponible para evitar la muerte de un individuo infectado, y la aplicación innecesaria de un protocolo antirrábico. En el caso de la paciente, se procedió de la siguiente manera: Lavado a presión, antisepsia y sutura con puntos separados de herida incisa en cuello. Profilaxis antitetánica y antirrábica de acuerdo a las normas nacionales vigentes. Inicio de tratamiento con amoxicilina/sulbactam más ciprofloxacina por vía parenteral previa interconsulta con infectología, con internación de 24 horas y alta clínica con indicación de completar esquema de antibiótico por vía oral. Vacuna antirrábica y observar alteraciones de comportamiento dentro de los 15 días post mordedura. Actualmente la paciente no presenta síntomas relacionados a la rabia.

Bibliografía

1. Villagra V, Cáceres D, Alvarado S, et al. Caracterización epidemiológica de mordeduras en personas, según registro de atención de urgencia. Provincia de Los Andes, Chile. Epidemiología. Rev Chilena Infectol. 2017;34(3):212-20.

Palabras clave: Mordedura canina. Profilaxis antirrábica.