



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 347/172 - DE LA INFECCIÓN CUTÁNEA A LA HEPATITIS...

E. Valle Cruells<sup>a</sup>, A. Ripoll Ramos<sup>a</sup>, I. Fontcuberta Munarri<sup>b</sup> y M. Medina Marroquín<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. CAP Valldoreix. Barcelona. <sup>b</sup>Enfermera. Centro de Atención Primaria Valldoreix. Barcelona.

<sup>c</sup>Médico Adjunto. CAP Turó de Can Mates. Sant Cugat. Barcelona.

### Resumen

**Descripción del caso:** Paciente de 81a con antecedentes de artrosis y dislipemia en tratamiento, acude a CAP para valoración de herida pretibial tras caída casual hace una semana. Ante la evidencia de infección cutánea, y dado que no presenta antecedentes de alergia a fármacos, se pauta tratamiento con amoxicilina-ac. clavulánico 500/125 1/8h 7 días. Cinco días después del inicio del tratamiento, acude de nuevo al Centro por malestar general prurito generalizado y náuseas. Niega acolia ni coluria. Afebril.

**Exploración y pruebas complementarias:** Exploración física: ictericia conjuntival y cutánea. AR mvc. Abdomen: blando y depresible. No masas ni megalias. PPL negativa. NRL: consciente y orientada. No signos meníngeos. No flapping.

**Orientación diagnóstica:** Con la sospecha diagnóstica de hepatitis aguda, se decide derivación UCIA Hospitalarias donde se realiza: análisis sanguíneo: Hb13, leucocitos 7.82, 230.000 plaquetas. PCR 18 mg/L, bilirrubina total 6,2, Bb directa 5,5. AST 134, ALT 312, GGT 376, FA 347, TP 106%. Serologías hepatitis y herpes negativas. Estudio de autoinmunidad negativo. Ecografía abdominal: hígado aumentado de tamaño a expensas de LHI, heterogéneo. Vesícula poco distendida sin imágenes de litiasis ni signos inflamatorios. Vía biliar intrahepática y colédoco no dilatados. TAC toracoabdominal: sin alteraciones significativas.

**Diagnóstico diferencial:** Ictericia sin acolia ni coluria: hemólisis, eritropoyesis ineficaz, reabsorción de grandes hematomas, sepsis, fármacos o enfermedades hereditarias (Gilbert o Crigler-Najjar). Ictericia con acolia o coluria con Bb directa > 50%: causa obstructiva, colestasis, hepatitis aguda, cirrosis hepática, fármacos o enfermedades hereditarias (Dubin-Johnson o enfermedad de Rotor). Tras el diagnóstico de hepatitis tóxica por amoxicilina- clavulánico, se administra sueroterapia y ante la disminución del prurito, se decide alta hospitalaria y seguimiento por su MAP y Digestivo.

**Comentario final:** Ante muchas infecciones en Atención Primaria, nuestra primera opción es amoxicilina-clavulánico. Debemos ser conscientes de que el ácido clavulánico puede causar hepatotoxicidad, frecuentemente reversible pero que puede ser grave y llegar a producir la muerte.

### Bibliografía

1. Ersoz G, Karasu Z, Yildiz C, et al. Severe toxic hepatitis associated with amoxicillin and clavulanic acid. *J Clin Pharm Ther.* 2001;26:225-9.
2. Fontana RJ, Shakil AO, Greenson JK, et al. Acute liver failure due to amoxicillin and amoxicillin/clavulanate. *Dig Dis Sci.* 2005;50:1785-900.

**Palabras clave:** Hepatotoxicidad. Amoxicilina-clavulánico. Ictericia.