



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/890 - PERFIL DE USUARIAS DE ANTICONCEPCIÓN POSTCOITAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

A. Manzano Guzmán^a, M. Vega Galindo^a, A. Ramírez Picó^a, M. Villena García^b, F. Peregrina Palomares^c y A. Arrabal Martín^c

^aMédico de Familia. Centro de Salud de Poeta Manuel de Góngora. Granada. ^bFarmacéutica de Familia. Centro de Salud de Poeta Manuel de Góngora. Granada. ^cEnfermero. Centro de Salud de Poeta Manuel de Góngora. Granada.

Resumen

Objetivos: Investigar las características de las pacientes que solicitan atención por anticoncepción poscoital (apc) en el servicio de urgencias de atención primaria

Metodología: Diseño: descriptivo transversal. Emplazamiento: Servicio de urgencias de atención primaria (SUAP). Material y método: pacientes que acuden solicitando anticonceptivo postcoital en un servicio de urgencias. Se estudian un total de 100 pacientes. Se les realiza entrevista clínica recogiendo variables: edad, toma previa, día de la semana y horario en el que consultan, motivo solicitud anticoncepción oral.

Resultados: Valoramos a 100 pacientes, con edad media de 20 años (± 5). Un 24,8% correspondían a pacientes menores de edad. Si analizamos los motivos de demanda encontramos: no protección anticonceptiva 25,6%, rotura preservativo 58,4%, olvido anticoncepción 6,3% retención preservativo 6,8%, otras 2,9%. En la administración previa obtuvimos los siguientes resultados: 17,6 toma primera vez, segunda 52,8%, tercera 13,9%, cuarta 10,2%, > 4 ocasiones 5,5%. Tiempo poscoital: 52,7% en primeras 12 horas, 33,8% entre 12-24 horas, 10,6% entre 24-48 horas, y 2,9% entre 48-72 horas. En el horario encontramos: mañanas 9,8%, tarde 51,9% y noches 38,3%. En la semana los lunes 5,3%, martes 3,9%, miércoles 4,8%, jueves 7,4%, viernes 13,1%, en fin de semana 65,6% (domingos 26,8%, sábados 38,8%).

Conclusiones: En los fines de semana, y en horario de tarde se atienden más de la mitad de las apc. Más de un 50% de pacientes solicitaron apc dentro de las primeras 12 horas. Como principal causa de demanda, se encuentra la rotura del preservativo. Solicitan apc por segunda ocasión más de un 50%.

Palabras clave: Atención Primaria. Contracepción. Urgencias.