



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/4174 - ¿QUÉ SABEMOS DE LA ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA VENOSA EN ATENCIÓN PRIMARIA?

M. García Vallejo^a, T. Pietrosanto^b, J. Ramírez Torres^c, N. Vázquez Gómez^d, E. Carrasco Carrasco^e, I. Gil Gil^f, J. Caballer Rodilla^g, M. Babiano Fernández^h, D. Fuertes Domínguezⁱ y M. Frías Vargas^a

^aMédico de Familia. Centro de Salud Comillas. Madrid. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Campello. Alicante. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Puerta Blanca. Málaga. ^dMédico de Familia. Centro de Salud Rafalafena. Castellón. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Abarán. Murcia. ^fMédico de Familia. Centro de Salud Vielha. Lleida. ^gMédico de Familia. Centro de Salud Restón. Madrid. ^hMédico de Familia. Centro de Salud Amaden. Ciudad Real. ⁱMédico de Familia. Centro de Salud Cervera de Pisuerga. Palencia.

Resumen

Objetivos: La enfermedad tromboembólica venosa (ETE) abarca la trombosis venosa profunda, la tromboembolia pulmonar y el síndrome posttrombótico. Su diagnóstico, prevención y tratamiento ha pasado a ser de gran relevancia en la práctica clínica de la Medicina de Familia. Con el objetivo de conocer las actuaciones y necesidades relacionadas con la ETE en Atención Primaria (AP) se ha realizado una encuesta mediante el formulario de Google <https://goo.gl/forms/frsNvOeZaiPFTcZG3> para los médicos y residentes de familia.

Metodología: Se difundió la encuesta, vía correo electrónico, mediante la base datos de socios de la Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMERGEN), previo aval institucional.

Resultados: 141 médicos han participado, 22,3% son residentes de Familia y 54% mujeres. La media de edad $44,51 \pm 13$ años, el 30,9% llevan trabajando más de 25 años. El 61,9% trabajan en un centro urbano de diferentes comunidades, el 47,5% trabajan en turno de mañana y el 41,8% en turno deslizando. El 95,7% creen que la ETE es frecuente y puede ser manejada en AP. El 71,6% han atendido < 10 pacientes con ETE en los últimos 6 meses. El 62,4% no utilizan la ecografía como técnica diagnóstica. La coordinación con el resto de especialistas es regular en 51,4%. El 80% de los encuestados considera que su formación es mejorable en factores de riesgo, profilaxis primaria, diagnóstico y tratamiento.

Conclusiones: Los encuestados en su mayoría, mujeres, con edad media de 44 años, trabajan en área urbana, de varias comunidades, más de 25 años en turno de mañana y deslizando. Casi la totalidad consideran que la ETE es frecuente y puede ser manejada en AP, sin embargo el 80% de los encuestados considera que su formación es mejorable. El 37% dispone de ecografía para su diagnóstico. El 71,6% atiende < 10 pacientes en 6 meses con ETE. La coordinación con el resto de especialidades es regular. De todo ello concluimos que hay mucho camino por recorrer para mejorar la ETE en AP.

Palabras clave: Enfermedad tromboembólica venosa. Atención Primaria.
1138-3593 / © 2018 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.