



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 347/1079 - VEO COSAS, SENTADAS A MI LADO

S. Martínez Diz<sup>a</sup>, J. Jódar Sánchez<sup>b</sup>, Y. Jiménez Ruiz<sup>c</sup> y R. Molina Ruano<sup>d</sup>

<sup>a</sup>Médico de Familia. Centro de Salud La Zubia. Granada. <sup>b</sup>Médico Residente de 4<sup>o</sup> año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Zubia. Granada. <sup>c</sup>Enfermera de Familia. Centro de Salud La Zubia. Granada. <sup>d</sup>Médico de Familia. Servicio de Urgencias. Hospital de Neurotraumatología y Rehabilitación. Granada.

### Resumen

**Descripción del caso:** Paciente de 61 años con antecedentes de enfermedad de Alzheimer de reciente diagnóstico en tratamiento con levodopa 100/carbidopa 25 cada 8 horas y pramipexol 0.18 cada 8 horas. Acude a consulta de atención primaria con un estado de agitación por "ver líneas y puntos en movimiento desde hace una semana refiriendo que la noche previa: "vi una mujer sentada a mi lado". No clínica neurológica asociada, ni infectiva ni focalidad neurológica. Ante la sintomatología presentada y tras exploración se contacta con neurólogo de referencia que diagnostica efecto secundario de pramipexol. Se suspende, consiguiendo desaparición completa de la sintomatología.

**Exploración y pruebas complementarias:** Paciente consciente y orientado. Colaborador y crítico son sus síntomas. Refiere hipersexualidad desde meses. Exploración sin afectación sensorio-percepción. Ansiedad en el contexto; previamente buen estado de la afectividad. Lenguaje coherente, juicio de la realidad conservado.

Pupilas isocóricas y reactivas a la luz. No alteración pares craneales. Fuerza y sensibilidad simétrica y conservada. Marcha normal y Romberg negativo. Auscultación: tonos rítmicos sin soplos, murmullo conservado. Abdomen: blando y depresible, sin dolor, masas ni megalias ni irritación peritoneal. Bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones de interés. Sistemático de orina normal y radiografía de tórax sin condensación ni pinzamiento.

**Orientación diagnóstica:** Alucinaciones visuales e hipersexualidad como efectos secundarios de pramipexol.

**Diagnóstico diferencial:** Alteraciones visuales secundarias a organicidad, tóxico o brote psicótico.

**Comentario final:** Los pacientes en tratamiento con agonistas dopaminérgicos y levodopa deben estar informados de los efectos secundarios como las alucinaciones generalmente visuales y alteración de la conducta (hipersexualidad). Realizar una buena anamnesis y valorar los efectos de la medicación, además de descartar organicidad, es fundamental para evitar la realización de pruebas invasivas, antes de descartar los diversos síntomas que dichos fármacos pueden generar.

### Bibliografía

1. Martínez-Corral M, Kulisevsky J. Pramipexol y enfermedad de Parkinson, una actualización. *Rev Neurol.* 2008;46(1):49-52.
2. Custodio N, Montesinos R, Lira D, et al.. Hypersexuality associated to pramipexole in the treatment of parkinsonian symptoms: presentation of 3 cases and review of the literature. *An Fac Med.* 2010;71(1):47-50.

**Palabras clave:** Alucinaciones. Dopaminérgico. Efectos secundarios.