



Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



347/565 - PREVALENCIA DE 31 DIAGNÓSTICOS EN 6 CONSULTAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

M. Villar Sotillo^a, E. Alcaraz Ferrer^a, C. Avellaneda Sánchez^b, S. Montesinos Sanz^a, T. Rama Martínez^c, A. Azcona Escolano^d, T. Kostina Kostina^e, M. Montserrat Bardid^f, J. Tarín García^g y P. Beato Fernández^h

^aMédico de Familia. Centro de Atención Primaria de Premià de Mar. Barcelona. ^bEnfermera. Consultori Barri Cotet. Premià de Dalt. Barcelona. ^cMédico de Familia. Centro de Atención Primaria El Masnou. Barcelona. ^dMédico de Familia. Consultori Barri Cotet. Premià de Dalt. Barcelona. ^eMédica de Familia. Centro de Atención Primaria de Premià de Mar. Barcelona. ^fEnfermera. Centro de Atención Primaria de Premià de Mar. Barcelona. ^gEnfermero. Centro de Atención Primaria de Premià de Mar. Barcelona.

Resumen

Objetivos: Conocer la prevalencia de los principales diagnósticos de patologías crónicas en 6 consultas de Atención Primaria de 3 diferentes centros de salud.

Metodología: Estudio descriptivo transversal a partir del apartado Dbsform del Sistema de Información de los Servicios de Atención Primaria del programa informático ECAP del Sistema Público de Salud. Se calculan las prevalencias de 31 diagnósticos. Ámbito: todas las personas asignadas a 6 consultas de 3 centros de Atención Primaria semiurbanos. Variables: número de pacientes con los registros de los diagnósticos estudiados. Cálculos: medias y porcentajes.

Resultados: 9.189 asignados (51,24% mujeres). Media de asignados por consulta 1.531 (máxima 1.856, mínima 912). Mayores de 65 años: 19,59%. Prevalencias: anemia ferropénica: 4,22%, hipertensión arterial (HTA): 20,22%, diabetes mellitus 2 (DM2): 7,15%, dislipemia: 21,59%, obesidad: 15,38%, enfermedad renal crónica (ERC): 3,57%, cardiopatía isquémica: 2,82%, insuficiencia cardíaca: 1,16%, fibrilación auricular: 2,24%, ictus: 1,28%, enfermedad vascular periférica (EVP): 1,83%, ansiedad: 15,16%, depresión: 8,99%, demencia: 0,95%, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH): 1,07%, epilepsia: 1,07%, migraña: 3,33%, enfermedad pulmonar crónica (EPOC): 2,21%, asma: 4,48%, síndrome de apnea del sueño (SAHOS): 1,63%, artrosis: 11,94%, osteoporosis: 3,13%, gota: 1,86%, neoplasias: 7,17%, hipotiroidismo: 5,52%, hipertiroidismo: 0,91%, bocio: 1,58%, incontinencia urinaria: 3,78%, hiperplasia benigna de próstata (HBP): 10,71% (hombres), patología péptica: 10,36%, hepatopatía: 3,57%. Media del número de pacientes por consulta y por patologías: HTA: 309,6, DM2: 109,5, dislipemia: 330,7, obesidad: 235,5, ansiedad: 232,2, depresión: 137,7, artrosis: 182,8, neoplasias: 109,8, HBP: 80, patología péptica: 158,7, hipotiroidismo: 84,5.

Conclusiones: En el conjunto de las personas asignadas a nuestros cupos, las prevalencias de HTA y de dislipemia superan el 20%. Las prevalencias de obesidad y ansiedad son superiores al 15%. Las prevalencias de artrosis, patología péptica y HBP en varones, están por encima del 10%. Más de un 5% de nuestros pacientes están diagnosticados de patologías que comportan una importante carga

de atención sanitaria: DM2, depresión, neoplasias e hipotiroidismo.

Palabras clave: Prevalencias. Atención Primaria. Enfermedades crónicas. Carga asistencial..