



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/2556 - DIFERENCIAS ENTRE LOS FUMADORES QUE NO INICIAN EL TRATAMIENTO DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y LOS QUE SÍ LO INICIAN

F. Madrona Marcos^a, P. Tarraga López^b, M. Villar Inarejos^c y M. Tárraga Marcos^d

^aMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Equipo de Atención Primaria Zona 5a. Albacete. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Zona V. Albacete. ^cMédico de Familia. Servicio de urgencias. Complejo Hospitalario de Albacete. ^dMédico Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zona V. Albacete.

Resumen

Objetivos: - Determinar las características diferenciales de la población a estudio.

Metodología: La muestra está constituida por 1484 sujetos que acudieron a la Unidad de Tratamiento Especializado en Tabaquismo durante las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012. Como pruebas estadísticas se utilizaron la chi-cuadrado y la prueba exacta de Fisher para variables cualitativas y t de Student para variables cuantitativas y se realizó una regresión logística para evitar variables confusionales. El nivel de significación se estableció con una $p < 0,05$.

Resultados: Se incluyeron en el estudio un total de 1484 pacientes, de ellos 731 sujetos abandonan el tratamiento sin acudir a la segunda consulta, esto es un 49,26% del total. En el modelo de regresión logística que se realizó no se observó que ninguna variable influyera de forma significativa sobre la muestra.

Conclusiones: Existe un porcentaje considerable de sujetos que, a pesar de acudir a una primera cita de deshabituación tabáquica, no continúan el mismo y rechazan continuar en segunda visita. Esto supone un fracaso que debemos continuar analizando de manera exhaustiva, ya que no hemos podido diferenciar, y que pueda permitirnos conocer los verdaderos motivos por los que abandonan el consumo de tabaco.

Palabras clave: Tabaquismo. Motivación. Deshabituación.