



Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

347/1530 - LA ECOGRAFÍA, UNA HERRAMIENTAS AL ALCANCE DEL MÉDICO DE FAMILIA ANTE UNA MASA CERVICAL EN UNA PACIENTE JOVEN

A. Vaca Recalde^a, R. Benito Fernández^b y S. Saltares Expolio^c

^aMédico Residente de 2º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. ^bMédico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. ^cMédico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 56 años que acude al centro de salud con una lesión laterocervical derecha de 3 cm de diámetro y varios días de evolución que no mejora a pesar de tratamiento antibiótico con amoxicilina clavulánico en las últimas 48 horas. Niega fiebre, odinofagia, pérdida de peso y conductas de riesgo.

Exploración y pruebas complementarias: En la exploración, se observa una masa eritematosa, caliente, fluctuante, dolorosa y de bordes definidos. Dada la lista de espera para una ecografía, la confluencia de múltiples estructuras anatómicas en la zona cervical y el inicio de esta técnica en los centros de salud, se realiza una ecografía de partes blandas para observar la localización, trayecto, consistencia, profundidad y adherencia a planos que tenga la masa. La ecografía nos muestra en la paciente una lesión de 3 cm de diámetro con material mixto hipoeoico y anecoico y leve doppler sin afectación de grandes vasos o tiroides compatible con el diagnóstico de absceso cervical.

Orientación diagnóstica: Según las características clínicas y ecográficas compatibles con un absceso cervical se procede al drenaje del mismo con emisión de material purulento que confirma el diagnóstico.

Diagnóstico diferencial: Las masas cervicales abarcan un amplio abanico de patologías como tumefacciones bacterianas (abscesos, sífilis terciaria, tularemia, arañazo de gato) víricas (mononucleosis, VIH), parasitarias (toxoplasmosis), micóticas (actinomicosis), neoplásicas (linfomas, la leucemia linfocítica crónica, metástasis de carcinoma de tiroides), embrionarias (teratomas, conducto tirogloso, quistes braquiales), inflamatorias (enfermedad de Kawasaki, Castelman) e idiopáticas (Kikuchi-Fujimoto o de Kimura).

Comentario final: Las características ecográficas de la lesión permiten un diagnóstico diferencial desde el centro de salud disminuyendo derivaciones innecesarias a especializada, disminuyendo las listas de espera y aumentando la capacidad de resolución en Atención Primaria

Bibliografía

1. Abdulmohsen A, Khaled A, Abdussalam A, et al. Ultrasonography for the diagnosis of parients

with clinically suspected skin and soft tissue infections: a systematic review of the literature. Riyadh: European Journal of Emergency Medicine. 2015.

2. Mark D, Heath A, Patrick S. Homemade ultrasound phantom for tea china identification of superficial soft tissue abscess. Seattle: Department of Pediatric Emergency Medicine, Seattle Children's Hospital, 2011.

Palabras clave: Ecografía. Absceso.