



# Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



## 424/773 - FACTORES ASOCIADOS AL USO DE PRESERVATIVO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

M. Torra Solé<sup>1</sup>, L. Fürstenheim Milerud<sup>2</sup>, D. de la Rica Escuin<sup>1</sup>, P. Bach Foradada<sup>3</sup>, N. Torra Solé<sup>4</sup>, S. Maestro Cebamano<sup>5</sup>, A. Márquez Vidal<sup>6</sup>, D. Florensa Cazorla<sup>7</sup>, G. Amat Camats<sup>8</sup> y A. Pons Rodríguez<sup>9</sup>

<sup>1</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Artesa de Segre. Lérida. <sup>2</sup>Enfermera de Familia. Centro de Salud de Balaguer. Lérida. <sup>3</sup>Enfermera. Centro de Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Departamento de Salud. Lérida. <sup>4</sup>Médico de Familia. Centro de salud Tàrrrega. Lérida. <sup>5</sup>Enfermera de Familia. Centro de salud de la Bordeta. Lérida. <sup>6</sup>Enfermera. Centro de Salud Rambla Ferran. Lérida. <sup>7</sup>Ingeniero Informático. Gestión de Servicios Sanitarios. Lérida. <sup>8</sup>Enfermera. Centro de Salud de Balaguer. Lérida. <sup>9</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Eixample. Lérida.

### Resumen

**Objetivos:** Las infecciones de transmisión sexual son un problema a nivel mundial. Con un aumento en menores de 25 y entre 25 y 35 años. Se pretende conocer los factores asociados al uso del preservativo entre los estudiantes universitarios en el último encuentro sexual.

**Metodología:** Estudio descriptivo de prevalencias, marzo-abril 2019. CEIC acreditado 19/062-P. Población universitaria de grado (curso 2018-2019): N = 846. Muestra: por conglomerados (facultades) y por conveniencia (clases). Variables: edad, sexo, fumador, orientación sexual, práctica relaciones sexuales, edad inicio relaciones sexuales, sexo bajo influencia alcohol/drogas, grado autoprotección, percepción disminución sensibilidad, exposición sin protección últimos 12 meses y último encuentro sexual, percepción efectividad preservativo. Recogida datos: cuestionario GoogleForm. Análisis: porcentajes, IC95%, media, desviación estándar, chi-cuadrado, t-Student, p < 0,05, odds ratio.

**Resultados:** Perfil estudiado: mujer (56,7%), edad media de 20,8 años [ $\pm$  3]. De ellos el 84,3% (n = 713) mantuvo relaciones sexuales en algún momento. Se observó menor uso del preservativo en el último encuentro sexual a mayor edad (34,1% en < 21 años; 43,6% en 21-24 años; 50% en  $\geq$  25 años; p = 0,01), en mujeres (44% versus 34% hombres, p < 0,01), en fumadores (49,6% versus 37,2% en no fumadores; p < 0,01). Menor uso en homosexuales (65%) versus bisexuales (56,5%) versus heterosexuales (36,1%), p < 0,01. La media de edad de inicio de las relaciones sexuales es estadísticamente más baja en los que no utilizaron preservativo (16,54 años versus 16,92 años en los que lo utilizaron, p < 0,01). El 42% tuvo alguna relación bajo los efectos del alcohol sin preservativo frente al 32,5% de los abstemios que no usaron preservativo, p < 0,01, relación que se repite con el cannabis (p = 0,01). El 51,5% de los que no se llevan preservativo cuando piensan que puede haber una relación, no utilizó preservativo en el último encuentro frente a un 29,2% que si se lo lleva cuando prevé un posible encuentro sexual, p < 0,01).

**Conclusiones:** Falta de uso del preservativo en el último encuentro sexual en mujeres, al aumentar

la edad, fumadores, homosexuales > bisexuales > heterosexuales. Edad de inicio de las relaciones más baja en los de más riesgo. Menor uso en los que no se llevan el preservativo cuando prevén un posible encuentro sexual.

**Palabras clave:** Preservativos. Universitarios. Infecciones de transmisión sexual.