Semergen. 2019;45(Espec Congr 1):58

Medicina de Familia. SEMERGEN

http://www.elsevier.es/semergen

424/3732 - EDAD, SEXO Y RAZA DE LOS PACIENTES CON FIBRILACIÓN AURICULAR INCLUIDOS EN EL ESTUDIO IBERICAN

P. Morán Oliva[1], J. Polo García[2], M. Turégano Yedro[2], N. Aguilar Gómez[3], B. López Uriarte[4], A. Rodríguez Pérez[5], E. Alarcón Cebrián[6], R. Latorre Santos[7], M. Babiano Fernández[8] y S. de Abajo Olea[9]

[1]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mendiguchía Carriche. Madrid. [2]Médico de Familia. Centro de Salud Aldea Moret. Cáceres. [3]Centro de Salud Torreblanca. Castellón. [4]Centro de Salud Humanes de Madrid. Madrid. [5]Centro de Salud Ordenas. A Coruña. [6]Centro de Salud Montesa. Madrid. [7]Centro de Salud Peñíscola. Castellón. [8]Centro de Salud Argamasilla de Calatrava. Ciudad Real. [9]Centro de Salud San Andrés de Rabanedo. León.

Resumen

Objetivos: Los objetivos generales de IBERICAN son determinar la prevalencia e incidencia de los factores de riesgo cardiovascular en España, así como de los eventos cardiovasculares. El objetivo del presente trabajo fue analizar la edad, el sexo y la raza de los pacientes con fibrilación auricular (FA) incluidos en el estudio IBERICAN.

Metodología: IBERICAN es un estudio longitudinal, observacional y multicéntrico en el que se incluyeron pacientes de 18 a 85 años atendidos en las consultas de Atención Primaria en España. El tamaño muestral fue de 8.066 pacientes, alcanzando el tamaño muestral objetivo, que serán seguidos durante al menos 5 años. Se analizaron las características demográficas (edad, sexo y raza) de los pacientes con fibrilación auricular (FA).

Resultados: El corte analizado (n = 8.066) presentó una prevalencia de FA del 5,79% (n = 467). La distribución por sexo: 56,5% (264) varones y 43,5% (203) mujeres. La prevalencia de FA fue en varones respecto a la de mujeres (7,20% vs 4,61%; $p < 0,001$). La edad media en los pacientes con FA fue de 70,07 ± 11,57 vs 57,12 ± 14,68 años en los pacientes sin FA. La distribución en porcentajes de edad de los pacientes con FA en 6 rangos etarios fue: 2,4% en menores de 40 años, 3,6% de 40 a 49 años, 10,1% de 50 a 59 años, 21,4% de 60 a 69 años, 40,0% de 70 a 79 años y 22,5% en aquellos con edad igual o mayor a 80 años. La mayoría de los pacientes incluidos fueron de raza blanca (98,9%; p = 0,003), siendo las razas negra y asiática las siguientes más prevalentes (0,4% p = 0,003).

Conclusiones: Los resultados de nuestro estudio muestran que los pacientes con FA incluidos son de mayor edad que los pacientes sin FA, siendo el intervalo de 70 y 79 años la franja de edad más prevalente para FA, con raza caucásica en su mayoría. Aparece con mayor frecuencia en varones respecto a mujeres, datos que son concordantes a los observados en otros estudios realizados en España.

Palabras clave: Fibrilación auricular. Estudio IBERICAN.
1138-3593 / © 2019 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.