



# Medicina de Familia. SEMERGEN



<http://www.elsevier.es/semergen>

## 424/1254 - PERFIL DE PACIENTES SUBSIDIARIOS DE VACUNA ANTITETÁNICA EN URGENCIAS DE UN CENTRO DE SALUD RURAL

J. Fernández Villar<sup>1</sup>, F. Martínez García<sup>1</sup>, M. Díez López<sup>2</sup>, L. García Andrés<sup>3</sup>, F. Álvarez-Franco Cañas<sup>4</sup>, M. Merino López<sup>5</sup> y M. Fernández Villar<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Médico de Familia. Centro de Salud Mansillas de las Mulas. León. <sup>2</sup>Enfermera. Centro de Salud La Palomera. León. <sup>3</sup>Médico de Familia. Centro de Salud José Aguado. León. <sup>4</sup>Médico de Familia. Centro de Salud La Bañeza 1. León. <sup>5</sup>Enfermera. Centro de Salud Mansilla de las Mulas. León. <sup>6</sup>Veterinaria. Centro de Salud Mansilla de las Mulas. León.

### Resumen

**Objetivos:** Se pretendía conocer cuáles son los diagnósticos más frecuentes de los pacientes que se vacunan en urgencias de un centro de salud rural y que porcentaje de pacientes necesita vacunación antitetánica según protocolo.

**Metodología:** Estudio descriptivo transversal. Revisamos el libro de urgencias de un centro de salud rural desde julio a diciembre del 2018. Precisaban vacunación, según protocolo, 170 pacientes. Representa un 4,9% del total de las urgencias en ese periodo. El ámbito de estudio fue una zona básica de salud rural de 4.900 habitantes.

**Resultados:** Distribución por sexo: 68,2% varones y 31,8% mujeres. Media de edad: 38,5 años. Los diagnósticos más frecuentes de los pacientes que precisaban vacunación antitetánica según protocolo fueron: Heridas inciso contusas (cabeza 25%, manos 20%, pies 16%); quemaduras 5,5% y mordeduras de animales 4,4%. Un 27% de estos pacientes fueron vacunados, de ellos, el 86% de la 1ª dosis y un 14% de dosis de recuerdo. El 60,2% no precisaron vacuna por estar correctamente vacunados. Un 12,8% de pacientes precisaban vacunación antitetánica y no fueron vacunados. En el 75,4% de los casos el médico y la enfermera atendieron juntos al paciente y en el 24,6% fue sólo la enfermera. Un 3,6% fueron accidentes laborales.

**Conclusiones:** El diagnóstico más frecuente por el que se vacuna del tétanos en urgencias son las heridas inciso contusas. De estos pacientes casi dos tercios no precisan vacunación por estar correctamente vacunados. Habitualmente estos pacientes son atendidos en conjunto por el médico y la enfermera.

**Palabras clave:** Vacuna. Urgencias. Rural.