Semergen. 2019;45(Espec Congr 1):3075

Medicina de Familia. SEMERGEN

http://www.elsevier.es/semergen

424/3428 - TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA DE MIEMBRO SUPERIOR

M. López Posada[1], C. Piñana Alonso[2], A. Revnic[3] y A. Guillén Bobé[4]

[1]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Almozara. Zaragoza. [2]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las Fuentes Norte. Zaragoza. [3]Médico de Familia. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza. [4]Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San José. Zaragoza.

Resumen

Descripción del caso: Mujer de 29 años de edad sin antecedentes personales de interés que acudió al servicio de urgencias hospitalarias por edema y eritema de progresiva aparición en extremidad superior izquierda a lo largo de las últimas 12 horas. Era veterinaria y refería haber sufrido durante los últimos 15 días arañazos de gato en mano ipsilateral en varias ocasiones. Relataba que los síntomas comenzaron en la mano y fueron extendiéndose en dirección craneal hacia el resto de la extremidad asociando parestesias y sensación de pesadez y de tirantez cutánea. Negaba anticoncepción hormonal, tabaquismo, episodios previos de inmovilización o esfuerzos físicos superiores a los habituales.

Exploración y pruebas complementarias: Constantes vitales dentro de la normalidad. Exploración física: heridas por arañazo de gato sin signos inflamatorios en dorso de mano y muñeca izquierdas. Empastamiento y eritema en el resto de la extremidad sin cordones venosos. Analítica sanguínea: sin alteraciones reseñables salvo test de dímero-D de 682 µg/L. Radiografía torácica (proyecciones postero-anterior y lateral): Silueta cardiomediastínica, vasculatura y parénquima pulmonar sin alteraciones significativas. Ecografía Doppler: Trombosis venosa axilo-subclavia.

Orientación diagnóstica: Trombosis venosa profunda (TVP) en miembro superior izquierdo.

Diagnóstico diferencial: El inicio del episodio actual se produjo hacía aproximadamente 12 horas. Debido a su profesión la paciente se encontraba expuesta a lesiones cutáneas provocadas por animales que pudieran desencadenar un proceso infeccioso. Sin embargo, las heridas halladas en la exploración no mostraban signos inflamatorios y se encontraban en fase de resolución. Paralelamente, la paciente no mencionaba haber padecido fiebre y en las pruebas complementarias realizadas no se detectó ningún hallazgo compatible con un cuadro infeccioso.

Comentario final: La TVP de miembros superiores es una enfermedad rara (representa aproximadamente entre el 1% y el 4% de todos los casos de TVP) e infradiagnosticada. Normalmente se presenta en varones jóvenes y atléticos con inicio agudo de dolor y edema en el brazo dominante tras una actividad intensa.

Bibliografía

1. Marín C, Ferreiro L, Tejera A, Roca J. Trombosis venosa profunda primaria de miembro superior. Semergen. 2015;41(4):15-7.

Palabras clave: Trombosis venosa profunda. Extremidad superior.

1138-3593 / © 2019 Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN). Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.