



Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



482/745 - UN RESFRIADO CON FINAL IMPREVISTO

J. López Marín¹, D. Roldán Lafuente², R. Romera Martínez³ y J. López Díez¹

¹Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isaac Peral. Cartagena. Murcia.

²Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casco Antiguo. Cartagena. Murcia.

³Residente de 4º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Menor. Cartagena. Murcia.

Resumen

Descripción del caso: Varón de 22 años que acude a consulta de Atención Primaria (AP) porque refiere desde hace 3 días, artromialgias, hiporexia, sensación distérmica, odinofagia y fiebre de hasta 39 °C. Tras iniciar tratamiento, regresa 2 días después de urgencia por dolor torácico retroesternal opresivo, irradiado a ambos hombros, sin cortejo vegetativo que empeora con los movimientos respiratorios. Tras hallazgos en ECG se deriva a urgencias hospitalarias.

Exploración y pruebas complementarias: TA: 124/59 mmHg, FC: 100 lpm, Tª: 36,8 °C, SatO₂: 98%, afectado por dolor, normohidratado, normocoloreado. Taquipneico en reposo. AC: rítmica sin soplos ni extratonos. AP: MVC sin ruidos sobreañadidos. MMII: sin edemas. ORL: faringe hiperémica sin placas ni exudados. ECG: ritmo sinusal a 95 lpm, PR normal, QRS estrecho, eje a 90°. Elevación de ST en II, III, aVF y v3-v6. Descenso ST en V1. Analítica: PCR: 12,2 mg/dl, leucocitos 24.710 (74,1% neutrófilos, linfocitos 13,5%, monocitos 11,4%), TnT us 1ª: 732 pg/ml, 2ª: 781 pg/ml, 3ª: 508 pg/ml, resto de analítica normal. Rx tórax: ICT normal. No pinzamiento de senos. Sin infiltrados o condensaciones parenquimatosas. Hilios normales. Ecocardiograma y telemetría: sin hallazgos significativos. ECG en consulta AP, tras alta: ritmo sinusal a 70 lpm, QRS estrecho. PR normal. Eje a 90°. Elevación ST "en guirnalda" de v1 a v3 con T negativa evolutiva en el resto de derivaciones.

Orientación diagnóstica: Miopericarditis aguda no complicada.

Diagnóstico diferencial: Síndrome coronario agudo, neumotórax, neumonía, TEP, disección aórtica.

Comentario final: La pericarditis aguda sigue siendo un diagnóstico frecuente, representando un 5% de los dolores torácicos no isquémicos que acuden a urgencias. Entre el 15 y el 35% presentan elevación de biomarcadores cardíacos (miopericarditis). La etiología más frecuente es la viral o idiopática, y tiene un pronóstico excelente a largo plazo, con resolución en 2-6 semanas tras tratamiento. La base del mismo son los AINEs y la colchicina. En nuestro caso, el paciente quedó asintomático a las 3 semanas del inicio de la clínica.

Bibliografía

1. Fisterra.com, Atención Primaria en la Red [sede web]. Pericarditis aguda. Última revisión en

diciembre 2015 [acceso 20 de agosto de 2020].

Palabras clave: Pericarditis. Corazón. Dolor torácico.