



Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

245/34 - COMORBILIDADES EN EL VARÓN QUE ENVEJECE: DISFUNCIÓN ERÉCTIL Y SÍNTOMAS DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

N. Pascual Regueiro^a, J. Martínez Jabaloyas^b, M. Hortelano Perales^c, J. Baleriola Júlvez^d y L. Casco Sales^e

^aMédico de Familia. Centro de Salud Integrado Alto Palancia. Segorbe. Castellón. ^bJefe Clínico del Servicio de Urología. Hospital Clínico Universitario. Valencia. ^cMédico de Familia. Centro de Salud Integrado de Vall d'Uixó. Castellón. ^dMédico de Familia. Responsable de la Unidad Docente de M.I.R. Valencia. ^eCoordinadora de Enfermería. Centro de Salud Integrado de Vall d'Uixó. Castellón.

Resumen

Objetivos: Buscar la existencia de una correlación entre estos dos síntomas en el varón añoso.

Metodología: Se recogió una muestra aleatoria de 306 pacientes, varones residentes en Vall d'Uixó, (Castellón), con una población de unos 35.000 habitantes. Durante la entrevista se toman medidas antropométricas, se registran antecedentes personales y cuatro cuestionarios: subescalas de ansiedad y depresión de Goldberg, Test de SHIM (Sexual Health Inventory for Men o versión abreviada de IIEF) e IPSS (Escala Internacional de Sintomatología Prostática). Se realizó una analítica completa con PSA, Testosterona total, SHBG (globulina transportadora de esteroides) y albúmina.

Resultados: Los varones más de 40 años con mayor sintomatología urinaria, experimentaban un deterioro en su función eréctil que se relaciona con la gravedad de los síntomas.