




Medicina de Familia. SEMERGEN



<https://www.elsevier.es/semergen>

244/53 - EVALUACIÓN DEL MANEJO EN EL PACIENTE CON EPOC EN UN CENTRO DE SALUD URBANO

A. Baca Osorio^a, R. Reina González^b, Á. Camarena Herrera^b, C. Gómez Sánchez-Lafuente^c, R. Poyato Ramos^d y L. Ginel Mendoza^e

^aMédico de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. ^bMédico Residente de 4^º año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. ^cMédico Residente de 3^{er} año de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud. Ciudad Jardín. Málaga. ^dEnfermero. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga. ^eMédico de Familia. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.

Resumen

Objetivos: Analizar la asistencia prestada y registrada por médicos y enfermeros de Atención Primaria a pacientes incluidos en el proceso EPOC en un Centro de Salud urbano.

Metodología: Estudio observacional descriptivo transversal y retrospectivo realizado en pacientes incluidos en el proceso EPOC antes de septiembre 2015. Periodo de tiempo evaluado: septiembre 2015 a septiembre 2016. Variables a estudio: sociodemográficas, adecuación diagnóstica, determinación gravedad, registro hábito tabáquico y plan de cuidados, ayuda deshabituación tabáquica, espirometría anual, vacunación antigripal y antineumocócica, uso de broncodilatadores y derivación a neumología. Muestreo aleatorio sistemático. Estadística descriptiva.

Resultados: 140 pacientes analizados, edad media $66,94 \pm 12,07$ años. Prevalencia en hombres (70,3%). El 77,1% tiene diagnóstico adecuado de EPOC (registro de espirometría alguna vez). Predominio de casos leves (25%) y moderados (25%), sin evaluarse la gravedad en el 36,4%. Registro de plan de cuidados en 25,7% y de hábito tabáquico en 88,6%. El 70,6% de pacientes recibieron apoyo para la deshabituación. 58 casos (41,4%) se realizaron espirometría de control. 38,6% se vacunaron en la campaña antigripal 2015/16. De los 118 pacientes con indicación de vacunación antineumocócica, la recibieron 35 (29,7%). El 87,03% de pacientes con sintomatología permanente reciben tratamiento con broncodilatadores. El 73,7% de casos con EPOC grave o muy grave (valoración espirométrica) han sido derivados a neumología.

Conclusiones: La intervención realizada sobre el paciente con EPOC resulta insuficiente. Se debería potenciar la vacunación y un correcto plan de cuidados coordinado entre médicos y enfermería para la prevención de complicaciones.