




# Medicina de Familia. SEMERGEN

<http://www.elsevier.es/semergen>



## 48 - PETICIONES DE HEMOGLOBINA GLICADA (HbA<sub>1c</sub>) EN EXTREMADURA. ¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?

M.B. Esteban Rojas<sup>1</sup>, F. Cabezudo Moreno<sup>1</sup>, M. Carretero Villanueva<sup>2</sup>, C. de la Cruz Ledesma<sup>3</sup>, M.A. Rascón González<sup>4</sup>, M.I. Candelario Moreno<sup>5</sup>.

<sup>1</sup>R3 MFyC. C.S. Zona Centro (Badajoz). <sup>2</sup>Médica de Familia. COPF Zafrá (Badajoz). <sup>3</sup>R3 MFyC. C.S. Villanueva de la Serena Norte (Badajoz). <sup>4</sup>Médica Adjunta MFyC. Área de Salud Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz). <sup>5</sup>Médica Adjunta MFyC. PAC Castuera (Badajoz).

### Resumen

**Objetivos:** Estimar la cadencia de las peticiones de HbA<sub>1c</sub> en Extremadura. Cotejar si se cumplen las recomendaciones de la Sociedad Americana de Diabetes (ADA) de medir la HbA<sub>1c</sub> en pacientes con diabetes cada seis meses si hay buen control y cada tres si no lo hay.

**Metodología:** Se utilizaron dos bases de datos del Servicio Extremeño de Salud (SES), la de medicamentos dispensados en farmacias para conocer los sujetos que han retirado medicación del grupo ATC10 (Sistema de clasificación anatómica, terapéutica y química; Fármacos usados en diabetes) durante los años 2012, 2013 y 2014, y la de analíticas realizadas en la región para conocer las determinaciones de hemoglobina glicosilada que se hicieron en esos mismos años. Se utilizó el padrón de población de Extremadura en la mitad del periodo (INE, 2013). Se consideró paciente con diabetes a todos los que retiraron medicación de ese grupo en el periodo en estudio y a los que aún sin retirar esa medicación tenían analíticas con HbA<sub>1c</sub> y la media de estas era igual o superior a 6,5%. Se consideró prediabetes cuando no cumplían ninguno de esos criterios, pero presentaban una HbA<sub>1c</sub> mayor de 5,7% y menor de 6,5%.

**Resultados:** En el trienio estudiado se determinaron 403.644 HbA<sub>1c</sub> en 177.877 sujetos. 241.469 (59,8%) en 75.497 sujetos con diabetes (1,07 determinaciones/año). Hay 162.172 (40%) en sujetos que no padecen diabetes, 69.365 (42%) en 45.891 con prediabetes, y 84.679 (58%) en 63.044 sin prediabetes. 20.246 (21% del total) pacientes con diabetes en tratamiento no tienen registrada ninguna determinación analítica en el trienio estudiado.

**Conclusiones:** La frecuencia de determinación de la HbA<sub>1c</sub> en pacientes con diabetes está muy lejos de lo que recomienda la ADA. Se piden un número excesivo de determinaciones en pacientes sin diabetes con escasa justificación.

**Palabras clave:** Hemoglobina glicada, periodicidad, petición, Extremadura.