




Neurology perspectives



18142 - EFICACIA Y TOLERABILIDAD DE CENOBAMATO EN PACIENTES CON EPILEPSIA FARMACORRESISTENTE

Lallana Serrano, S.; Gifreu, A.; Quintana, M.; Abraira, L.; Campos-Fernández, D.; Fonseca, E.; Santamarina, E.; Toledo, M.

Servicio de Neurología. Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Resumen

Objetivos: Cenobamato, un nuevo medicamento anticrisis (MAC) que actúa como inhibidor de los canales de sodio y modulando el receptor GABAA, ha demostrado eficacia en ensayos clínicos en epilepsia focal refractaria. Nuestro objetivo será describir la eficacia y tolerabilidad del cenobamato en la práctica clínica habitual.

Material y métodos: Estudio observacional retrospectivo que incluye pacientes adultos con diagnóstico de epilepsia focal a los que se inició tratamiento con cenobamato entre marzo de 2021 y enero de 2022.

Resultados: Se incluyeron 27 pacientes (edad media $29,7 \pm 7,9$ años; 59,3% hombres) con un seguimiento medio de 7,2 meses. Todos cumplían criterios de farmacorresistencia, en tratamiento con 3 MACs de mediana (IQR 3-4). A los 3 meses las crisis disminuyeron en frecuencia en 18 pacientes (77%), con una tasa de respondedores (reducción de crisis mayor al 50%) del 52,8% (n = 14). Este efecto se mantuvo a lo largo del seguimiento, pasando de una mediana de 30 crisis mensuales (IQR 12-60) a 4 crisis a los 3 meses (IQR 1-20), 4 crisis a los 6 meses (IQR 1,5-16), 6 crisis a los 9 meses (IQR 1,75-22,5) y 8 crisis a los 12 meses (IQR 1,5-26,25). El 70,4% de los pacientes (n = 19) presentaron efectos adversos siendo los principales la somnolencia (n = 16; 59,2%) y la inestabilidad (n = 6; 22,2%). En 2 pacientes (7,4%) se retiró el tratamiento por falta de eficacia y efectos adversos.

Conclusión: El cenobamato es un fármaco eficaz y seguro en pacientes con epilepsia farmacorresistente.