



# Neurology perspectives



## 17612 - MIRANDO LA CARA DEL SÍNDROME DE "HOMBRE EN UN BARRIL": A PROPÓSITO DE UN CASO

Espinosa Sansano, M.; Navarro Quevedo, S.; Górriz Romero, D.; Pedrero Prieto, M.; Navarro Mocholi, E.; Jiménez Jiménez, J.; Tarruella Hernández, D.; Sivera Mascaró, R.

Servicio de Neurología. Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

### Resumen

**Objetivos:** Presentamos el caso de un varón de 84 años con antecedentes de enfermedad vascular periférica, ictus isquémico silviano izquierdo sin secuelas, deterioro cognitivo leve y sialolitiasis de repetición.

**Material y métodos:** Descripción del caso.

**Resultados:** Ingresa por un cuadro de debilidad progresiva en miembros superiores de dos meses de evolución, inicialmente afectando a miembro superior derecho y posteriormente al izquierdo, acompañado de cervicodorsalgia. A la exploración se evidenciaba una debilidad asimétrica restringida a MMSS de predominio distal y en extensión de codos, así como atrofia evidente en antebrazos, manos y supraescapular derecha. Existía actividad espontánea franca en deltoides y abolición de reflejo tricipital, con una exploración sensitiva poco congruente. Aparte destacaba una tumoración dura parotídea derecha de 4-5 cm. El electromiograma evidenció normalidad de conducciones sensitivas, disminución de CMAP en nervios medianos, cubitales y radiales, con normalidad del nervio musculocutáneo y espinal. Asimismo, se detectó actividad espontánea prominente en musculatura de MMSS.

**Conclusión:** Las etiologías asociadas al síndrome del hombre en barril son extensas, y pese a que el carácter progresivo en este paciente nos podía orientar a una enfermedad de motoneurona, la neuroimagen puso de manifiesto una lesión mal delimitada de partes blandas, ósea en C7-T1, con infiltración de agujeros de conjunción y estenosis intracanal desde C4 a T6. El diagnóstico histológico se consiguió mediante biopsia de la lesión parotídea y biopsia percutánea de la lesión cervical confirmando el diagnóstico de linfoma B que fue tratado con quimioterapia, pese a lo que el paciente falleció.