



Radiología



0 - HALLAZGOS EXTRACOLÓNICOS INCIDENTALS CLÍNICAMENTE IMPORTANTES EN 600 COLONOGRAFÍAS POR TC (CTC): INFLUENCIA EN EL MANEJO Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES

A. Rois Siso, J. Rodríguez Antuña y M.J. Martínez-Sapiña Llanas

A Coruña, España.

Resumen

Objetivos: Describir la prevalencia y las características de los hallazgos extracolónicos clínicamente importantes que son detectados de manera incidental en estudios de colonografía por TC (CTC), realizados por diferentes indicaciones (cribado o colonoscopia óptica incompleta), y su implicación en el manejo de los pacientes.

Material y método: Se ha realizado una revisión retrospectiva de los hallazgos extracolónicos incidentales, clínicamente importantes, observados en 600 CTC, realizadas en nuestro hospital desde el 1/9/2010 hasta el 30/2/2012. Los hallazgos extracolónicos en la CTC se clasifican según su relevancia clínica en graves, moderados o leves. Los de mayor importancia incluyen aquellos que requieren cirugía, intervención médica y/o estudios adicionales. Todos los casos han sido correlacionados con el diagnóstico anatómo-patológico, pruebas de imagen y seguimiento clínico posteriores.

Resultados: Un total de 34 pacientes (5,6%) tenían hallazgos extracolónicos importantes en la CTC: aneurismas aórticos (n = 12), masas suprarrenales indeterminadas (n = 4), tumores renales sólidos (n = 3), neoplasias gástricas (n = 3), osteoporosis severa con colapsos vertebrales (n = 3), neoplasias pancreáticas (n = 2), hernias diafragmáticas (n = 2), lesiones sólidas en intestino delgado (n = 2), carcinoma pulmonar (n = 1), derrame pleural (n = 1), metástasis óseas (n = 1) y broquiectasias quísticas (n = 1). De ellos, 2 pacientes requirieron atención médica inmediata y 32 tenían hallazgos importantes, pero no agudos. Siete pacientes requirieron tratamiento quirúrgico (1,16%).

Conclusiones: En nuestra revisión, la prevalencia de los pacientes con hallazgos extracolónicos importantes que requirieron acciones diagnósticas o terapéuticas posteriores fue de un 5,6%. El hallazgo más prevalente fue el aneurisma de aorta abdominal. Detectar las anomalías extracolónicas incidentales en la CTC permite la posibilidad de un tratamiento precoz en pacientes asintomáticos.