



Radiología



0 - IMPACTO CLÍNICO DEL ANÁLISIS DE ATENUACIÓN DEL PARÉNQUIMA PULMONAR EN PACIENTES CON EPOC

C. Utrilla Contreras, M. Fernández-Velilla Peña, R. Galera, I. Martínez Cerón, F. García-Río y M.I. Torres Sánchez

Madrid, España.

Resumen

Objetivos: Determinar la relación entre las medidas de atenuación del parénquima pulmonar obtenidas mediante TC cuantitativa y la disnea, calidad de vida, exacerbaciones, índices multidimensionales y tolerancia al ejercicio en pacientes EPOC

Material y método: Se incluyeron 15 pacientes con EPOC (4 mujeres, 33% fumadores activos, 68 ± 10 años, FEV₁ post-Bd $51 \pm 14\%$ pred.). Se evaluó la disnea (mMRC), calidad de vida (SGRQ), exacerbaciones previas, índices BODE, ADO y SAFE, y la tolerancia al ejercicio (prueba de la caminata y prueba de ejercicio progresivo). El análisis de atenuación del parénquima pulmonar se realizó mediante TC multicorte, en inspiración y espiración, con posprocesado de datos para valoración de rangos de atenuación y percentiles.

Resultados: La disnea se relacionó con el percentil 90 en espiración ($r = -0,845$, $p = 0,036$) y el SGRQ con la anchura a mitad de pico ($r = -0,665$, $p = 0,026$). El número de hospitalizaciones se correlacionó con el valor inferior de atenuación en inspiración ($r = -0,650$, $p = 0,022$) mientras que el de exacerbaciones moderadas con el valor inferior de atenuación en espiración ($r = -0,662$, $p = 0,026$). El P30 en inspiración alcanza una gran relación con los índices BODE ($r = -0,805$, $p = 0,029$) y SAFE ($r = -0,828$, $p = 0,042$). La anchura a mitad de pico inspiratoria se correlaciona con la distancia caminada en 6 minutos ($r = -0,628$, $p = 0,029$) y con el incremento del volumen pulmonar tele-espiratorio ($r = 0,837$, $p = 0,005$), mientras que el volumen de atenuación media del pulmón derecho en inspiración es el principal determinante del consumo de oxígeno pico ($r^2 = 0,615$, $p = 0,021$).

Conclusiones: Existe una notable relación entre la extensión del daño parenquimatoso detectado por TC y variables clínico-funcionales en EPOC.