



Radiología



0 - UTILIDAD DE LA VOLUMETRÍA RENAL MEDIANTE TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA MULTIDETECTOR EN EL ESTUDIO PREOPERATORIO DE LA FUNCIÓN RENAL DEL DONANTE VIVO

I. Pulido Ruiz¹, M.A. Iribarren Marín¹, L. Ballester Macías², R. Iglesias Jerez³ y M.A. Gentil Govantes²

¹Servicio de Radiología; ²Servicio de Nefrología; ³Servicio de Medicina Nuclear, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Resumen

Objetivos: Estudiar la correlación entre el filtrado glomerular medido mediante gammagrafía con EDTA-Cr⁵¹ y el cálculo del volumen renal mediante TC multidetector en el estudio preoperatorio de la función renal del donante vivo.

Material y método: Se analizaron de forma retrospectiva aquellos individuos candidatos a donante renal vivo en nuestro centro entre abril de 2011 y agosto de 2013. Fueron sometidos de forma rutinaria a una gammagrafía con EDTA-Cr⁵¹ realizada para la determinación de la tasa de filtrado glomerular (TFG) y paralelamente a una TC multidetector abdominal, para estudio morfológico de los riñones y su vascularización, incluyendo la medición del volumen renal (VR) mediante un método semiautomático. Se comparó mediante pruebas de correlación lineal el grado de ajuste entre ambos métodos diagnósticos (TFG y VR).

Resultados: 47 individuos fueron incluidos en el estudio con un 57,4% de mujeres y una edad mediana de 47 años. El volumen renal derecho e izquierdo de los sujetos fue similar (154,1 vs 156,4 cm³, p = 0,33) al igual que los respectivos volúmenes corticales (99 vs 93,9 cm³, p = 0,21). La mejor correlación lineal se obtuvo entre la TFG no ajustada a la superficie corporal medida mediante EDTA-Cr⁵¹ y el VR total obtenido de la suma de ambos volúmenes parciales (r = 0,75, p < 0,001).

Conclusiones: La volumetría renal mediante TC multidetector es un método rápido, sencillo y cómodo que puede suponer una alternativa a la gammagrafía con EDTA-Cr⁵¹ para determinar la función renal preoperatoria en pacientes candidatos a donantes renales vivos.