



# Radiología



## 0 - ABSCESOS CERVICALES. APROXIMACIÓN A SU ETIOLOGÍA SEGÚN LA LOCALIZACIÓN ESPACIAL

F. Muñoz Parra<sup>1</sup>, I. Mendoza Arnau<sup>1</sup>, C. Ortiz Cuevas<sup>1</sup> y A. Izco Aso<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hospital de Alta Resolución de Guadix, Guadix, España. <sup>2</sup>Hospital de Alta Resolución de Loja, Loja, España.

### Resumen

**Objetivo docente:** Mostrar abscesos en diferentes localizaciones de los espacios cervicales. Caracterizarlos mediante TCMD, y según su localización aproximarnos a su etiología. Demostrar hallazgos radiológicos que implican actuación terapéutica urgente y facilitan su abordaje.

**Revisión del tema:** Los espacios cervicales vienen determinados por la fascia cervical profunda que se divide en tres capas (superficial, media y profunda). Utilizaremos de referencia el hueso hioides para clasificarlos según su localización en suprahioides (parotídeo, masticador, parafaríngeo, faringomucoso, sublingual, submaxilar y bucal), infrahioides (visceral y cervical profundo), supra e infrahioides (carotídeo y retrofaríngeo). El origen suele ser un foco séptico dentario, glandular, de las amígdalas, de adenopatías infecciosas, senos paranasales o bien anomalías del desarrollo embrionario en determinadas estructuras que desencadenan la formación de un absceso. Presentamos abscesos cervicales localizados en el espacio masticador y carotídeo por conglomerados adenopáticos en infecciones por VIH y TBC, en el espacio visceral un absceso tiroideo en paciente con fístula del seno piriforme demostrada con posterioridad, submaxilares de origen odontogénico, parafaríngeos, periamigdalinos y facial en paciente con sinusitis maxilar y celulitis orbitaria asociada. La diseminación transespacial, infiltración grasa, afectación de las fascias y presencia de gas son signos radiológicos de fascitis necrotizante que implican una actuación terapéutica urgente por la gravedad del cuadro.

**Conclusiones:** La localización de los abscesos cervicales y los signos radiológicos demostrados con el TCMD, aproximan a su etiología y facilitan un abordaje terapéutico adecuado.