



Radiología



0 - AFASIAS: DE BROCA Y WERNICKE A UN COMPLEJO SISTEMA DEL LENGUAJE CÓRTICO-SUBCORTICAL

P. Carreño Morán¹, J.A. Juanes Méndez¹, J. Benito Díaz², J.C. Paniagua Escudero¹, V. Ladera Fernández³ y M.V. Perea Bartolomé³

¹Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca, España. ²Salamanca NMR Center, Salamanca, España.

³Universidad de Salamanca, Facultad de Psicología, Salamanca, España.

Resumen

Objetivos: Describir las principales áreas del lenguaje (corticales) y las conexiones mediante los haces de sustancia blanca (subcortical). Determinar la localización anatómica de los surcos, circunvoluciones y áreas del lenguaje en nuestras pruebas de imagen, ya sean TC o RM. Describir la técnica de RMf del lenguaje mediante BOLD y tractografía y el mapeo intraoperatorio cortico-subcortical. Determinar la precisa localización funcional de las áreas del lenguaje en cada paciente mediante RM funcional con técnica BOLD y tractografía mediante tensor de difusión o SPECT: técnica, indicaciones y limitaciones.

Material y método: Pacientes con afasia entre 2009-2013 a los que se realizó TC, RM, SPECT y RM funcional y tractografía normales y de pacientes que presentan las principales patologías en las áreas del lenguaje. Pacientes con tumores en áreas elocuentes a los que se realizó RMf y tractografía y mapeo intraoperatorio del lenguaje, el *gold standard*.

Resultados: Todas las patologías que afecten a las áreas del lenguaje pueden causar afasia. La causa más frecuente en la práctica clínica son los ACV isquémicos o hemorrágicos, y con menor frecuencia tumores, patología inflamatoria-infecciosa, yatrógena, afasias primarias... Presentamos estudios de TC, RM, SPECT y RM funcional y tractografía normales y las principales patologías del lenguaje que nos encontramos en la práctica clínica, resaltando las indicaciones de cada una de ellas.

Conclusiones: Un adecuado conocimiento anatómico y funcional del complejo sistema del lenguaje en las pruebas de imagen es imprescindible para el radiólogo.

Asimismo, es necesaria la adecuada colaboración interdisciplinaria de neurólogos, neurocirujanos, neuropsicólogos, neurofisiólogos y radiólogos.