



Radiología



0 - HALLAZGOS INCIDENTALS EXTRAESPINALES EN LOS ESTUDIOS DE RM DE COLUMNA CERVICAL Y LUMBAR

T. Martín Noguerol¹, J.P. Martínez Barbero¹, I. Rodríguez Jiménez¹, S. Cánovas Delgado² y E. Aumente Rubio³

¹Clínica las Nieves, Neurroradiología, Jaén, España. ²DADISA, Cádiz, España. ³RESSALTA, Córdoba, España.

Resumen

Objetivos: Determinar la prevalencia de hallazgos incidentales extraespinales en estudios de RM de columna cervical y lumbar, catalogando su relevancia clínica, y comparación con datos publicados para validar la capacidad de detección en la práctica clínica diaria.

Material y método: Se evaluaron de manera prospectiva 48 estudios de RM de columna cervical y 94 de RM lumbar por dos neurroradiólogos con experiencia en columna. Los hallazgos fueron recogidos en una plantilla clasificados adaptados al sistema de hallazgos incidentales del CT *Colonography Reporting and Data System* (C-RADS) para regiones cervical y lumbar. El protocolo de estudio básico fue en columna lumbar de secuencias sagital T1 y T2 y axial T1, y en columna cervical de sagital T1 y T2 y axial T2. Puntualmente se disponía de otras secuencias (sagital STIR, difusión o coronal T2) dependiendo de la sospecha diagnóstica. También se incluyeron los hallazgos presentes en las imágenes localizadoras.

Resultados: Del total de estudios evaluados, un importante porcentaje 40% (56) presentaron un hallazgo incidental (45% en columna lumbar y 30% en cervical). En la columna lumbar, los más frecuentes fueron miomas uterinos en 7 casos, diverticulosis cólica en 6 y quistes renales en 7. Se detectó 1 aneurisma de aorta abdominal y 1 engrosamiento de mucosa rectal confirmado como carcinoma. En la columna cervical, destacaron 6 quistes tiroideos y 5 poliposis nasosinuales.

Conclusiones: El alto porcentaje de hallazgos extraespinales, y su potencial relevancia diagnóstica, hacen fundamental su consideración al informar estudios de RM de columna. Nuestros resultados son acordes con los publicados recientemente.