



Radiología



0 - Colpocistodefecografía con bario en el intestino delgado. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo elaborar el informe radiológico?

M.J. Regaña Feijóo, L. Domínguez Gómez, G. García Gutiérrez, T. Díaz Antonio, M.M. García Gallardo y J. López Hidalgo

Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Virgen de la Victoria, Málaga, España.

Resumen

Objetivo docente: Proponemos una revisión de la técnica, indicaciones y hallazgos que podemos encontrarnos, presentando casos de las diversas patologías que revisaremos.

Revisión del tema: En primer lugar exponemos la preparación previa a la realización de la prueba del paciente y el material y método utilizado. Posteriormente revisaremos la técnica, explicando el método de adquisición de imágenes en reposo, retención y esfuerzo. Tras la obtención de imágenes, se lleva a cabo el procesado de las mismas, con medición del ángulo ano-rectal y longitud del canal anal en las distintas fases. Así mismo, mediremos y compararemos la altura de los compartimentos perineales en las distintas fases. Seguidamente valoraremos si los hallazgos corresponden a una defecación dentro de la normalidad o presenta alguna alteración o hallazgos patológico. Las anomalías principales que proponemos revisar son el rectocele, enterocele, incontinencia fecal, estreñimiento, intususcepción, anismo y síndrome del periné descendido. Expondremos con diversos casos estudiados en nuestro hospital tanto el material y método, como la técnica y los hallazgos tanto normales como patológicos.

Conclusiones: La colpocistodefecografía con bario en el intestino delgado es una prueba útil y asequible para el diagnóstico de la patología de suelo pélvico y de la patología de la defecación, por ello, creemos que el radiólogo debe conocer cómo y para qué hacer esta prueba y elaborar un correcto informe radiológico.