



Radiología



0 - Leiomatosis peritoneal diseminada: Hallazgos por imagen

C.L. Fernández Rey, J. Pereda Rodríguez, C. Oliva Fonte, L. Pérez Tapia, M. Lobo García y J. González Llorente

Complejo Hospitalario de Segovia, Segovia, España.

Resumen

Objetivo docente: Analizar los principales signos diagnósticos por imagen de la leiomatosis peritoneal diseminada. Discutir el método diagnóstico de elección por imagen. Realizar un adecuado diagnóstico diferencial del proceso. Analizar e ilustrar las posibles complicaciones del cuadro.

Revisión del tema: Se revisan los hallazgos por imagen descriptivos y característicos de la leiomatosis peritoneal diseminada en ecografía, TC y RM. -Se establece el diagnóstico diferencial. Se reseñan los datos de mayor interés en el manejo diagnóstico de la enfermedad. Se discuten e ilustran las complicaciones de la enfermedad.

Conclusiones: La leiomatosis peritoneal diseminada es una entidad infrecuente. La familiarización con los hallazgos por imagen resulta esencial para un diagnóstico precoz y certero. La importancia principalmente radica en un manejo adecuado del proceso y descartar otras opciones diagnósticas más agresivas y de peor pronóstico. Debe considerarse la posibilidad de complicación del proceso en el debut agudo del cuadro.