



# Radiología



## 0 - PATOLOGÍA INFLAMATORIA-INFECIOSA DE LAS TROMPAS DE FALOPIO

S. Claret Loaiza, V.F. Cáceres Filippon y P. Solano Díaz

Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España.

### Resumen

**Objetivo docente:** Las trompas de Falopio pueden verse implicadas en el seno de diversos procesos inflamatorios-infecciosos pélvicos, ya sea de forma primaria o por contigüidad. La forma más común de presentación es como trompa dilatada, con oclusión de su porción distal y acumulación de líquido retrógradamente. En función de las características de este líquido estaremos ante un hidrosálpinx (agua), un piosálpinx (pus) o hematosálpinx (sangre). Las principales patologías que dan lugar a estas entidades son: la enfermedad inflamatoria pélvica (EPI) y la endometriosis.

**Revisión del tema:** La EPI se considera una enfermedad de transmisión sexual que afecta al aparato genital femenino (endometrio, trompas y ovarios) uni o bilateralmente. En los 2/3 de los casos están implicados la *Neisseria gonorrhoeae* y la *Chlamydia trachomatis*, aunque no son raras las infecciones polimicrobianas. En la historia natural de esta enfermedad se distinguen tres fases: la salpingitis, limitada a la trompa; la piosálpinx, de contenido purulento e inflamación peritubárica, y el absceso tubo-ovárico, con implicación del ovario ipsilateral. Con respecto a la endometriosis, hasta en un 30% de los casos afecta a las trompas, en forma de hidrosálpinx-hematosálpinx, o como una masa anexial compleja difícilmente distinguible de los abscesos tubo-ováricos.

**Conclusiones:** Junto con la clínica, los datos analíticos, y en ocasiones la anatomía patológica, las técnicas de imagen, tales como la ecografía, la TC y fundamentalmente la RM, constituyen un pilar fundamental para el diagnóstico y seguimiento de la patología inflamatoria-infecciosa tubárica.