



# Radiología



## 0 - ANÁLISIS DE RESULTADOS EN LAS PACIENTES DERIVADAS DESDE EL PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ A LA UNIDAD DE MAMA

Y. Rodríguez de Diego, S. Plaza Loma, M.E. Villacastín Ruíz, R. Pintado Garrido, I. Anacabe Goyogana y M. Mendo González

Hospital Universitario Río Hortega, Valladolid, España.

### Resumen

**Objetivos:** Analizar los resultados obtenidos en las pacientes derivadas desde el programa de cribado a la Unidad de Mama.

**Material y métodos:** Estudio retrospectivo de las pacientes remitidas desde el programa de cribado a la Unidad de mama del hospital entre 2009 y 2011.

**Resultados:** Entre 2009-2011 el Programa de Prevención del Cáncer de Mama estudió a 40413 mujeres de las cuales 2029 (5%) fueron remitidas a la Unidad de Mama para continuar estudio. Sus mamografías se clasificaron en categorías Birads 3 (84%), 4 (11%) y 5 (5%). El 2% de los Birads 3, el 35,6% de los Birads 4 y el 90% de los Birads 5 de las pacientes derivadas resultaron positivos para carcinoma, detectándose 188 carcinomas (9,2% del total de estudios derivados). La tasa de detección fue del 4,9‰, 4,46‰ y 4,63‰ en cada una de las rondas. Con respecto a los tipos histológicos, el carcinoma ductal infiltrante fue el más frecuente (76%), seguido del CDIS (13%) y el carcinoma lobulillar infiltrante (11%). Se realizó tratamiento conservador en un 72% de las pacientes con carcinoma. El 35% de las pacientes presentaban afectación ganglionar en el momento del diagnóstico aunque un 56% de las pacientes con ganglio centinela positivo no presentaron metástasis ganglionares en la linfadenectomía posterior, incluyendo 11 casos de micrometástasis.

**Conclusiones:** Con la creación de las Unidades de Mama se ha conseguido instaurar un circuito ágil que permite un diagnóstico y tratamiento rápido e integral de las pacientes derivadas del programa de cribado.