



# Radiología



## 0 - PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA GUIADA RADIOLÓGICAMENTE EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS SARCOMAS DE PARTES BLANDAS

M. Huete Naval<sup>1</sup>, J.A. Narváez García<sup>1</sup>, A. Güell Bara<sup>1</sup>, J. Hernández Gañán<sup>1</sup>, J. Isern Kebscull<sup>1</sup> y X. Sanjuán Garriga<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sección de Radiología musculoesquelética; <sup>2</sup>Servicio de Anatomía patológica, Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, España.

### Resumen

**Objetivos:** Evaluar la rentabilidad de la punción aspiración con aguja fina (PAAF) guiada por ecografía y/o TC en el diagnóstico de los sarcomas de partes blandas (SPB), y analizar si existen diferencias en función del grado histológico.

**Material y métodos:** Revisión retrospectiva de los casos de SPB visitados en la unidad de tumores músculo-esqueléticos a los que se realizó PAAF y BAG guiados radiológicamente, durante el período 2011-2014. Se excluyeron los pacientes a los que se les realizó PAAF pero no BAG guiada radiológicamente, así como los SPB localizados en mama y en cavidad peritoneal. Se registraron 68 casos, 30M y 38H, con edad media de 58a.(rango: 22-90).

**Resultados:** La PAAF estableció el diagnóstico de sarcoma en 34 pacientes, obteniendo una sensibilidad del 50% y un valor predictivo positivo (VPP) del 100%. En esta población, la sensibilidad y VPP de la BAG fue del 94% y 100% respectivamente. Los resultados de la PAAF estratificados en función del grado histológico fueron: alto grado (n = 42): diagnóstico de sarcoma en 29 casos, con una sensibilidad del 69%. Bajo grado (n = 26): diagnóstico de sarcoma en 5 casos, con una sensibilidad del 19%.

**Conclusiones:** La rentabilidad de la PAAF es baja en los SPB de bajo grado por su dificultad para diferenciar lesiones benignas o borderline. En SPB de alto grado, la sensibilidad diagnóstica de la PAAF (69%) es menor que la de la BAG (94%), pero suficientemente alta para representar una herramienta diagnóstica complementaria, especialmente en localizaciones anatómicas de acceso complejo para la BAG y en casos de recidivas.