



Radiología



0 - CORNADA ENVAINADA: UNA LESIÓN DESCONOCIDA PERO POTENCIALMENTE LETAL

L. Gijón de la Santa, I. Méndez Mesón, J.A. Pérez Retortillo, L. Nicolás Liza, A. Camarero Miguel y J.M. Ramia Ángel

Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara, España.

Resumen

Objetivo docente: Revisar las características por imagen de la cornada envainada. Poner en relieve el papel del radiólogo en el manejo de estos pacientes potencialmente graves.

Revisión del tema: Los encierros forman parte de un gran número de fiestas populares en España. En nuestra provincia, Guadalajara, atendemos a pacientes que provienen de los más de 500 eventos registrados anualmente. Las lesiones derivadas de estos eventos son muy variadas e incluyen desde simples contusiones a heridas potencialmente mortales como traumatismos graves, cornadas o daño vascular. Presentamos un estudio retrospectivo de nuestra experiencia en un periodo de 7 años (2008-2014), en el que hemos atendido 122 pacientes con heridas por asta de toro. La cornada envainada es una lesión poco frecuente que, aún siendo penetrante, no genera defecto cutáneo debido a la capacidad elástica de la piel, la cual, posteriormente al traumatismo, recupera su apariencia habitual o presenta únicamente un área equimótica. La importancia de estas lesiones radica en que durante la exploración inicial suelen ser infradiagnosticadas debido a que simulan una lesión superficial pudiendo tratarse de lesiones con pronostico pobre debido a los daños internos y a la demora diagnóstica. La TCMD es la técnica de elección en estos paciente puesto que aporta un diagnóstico rápido y preciso.

Conclusiones: La cornada envainada es una lesión poco frecuente aunque potencialmente letal que suele ser infradiagnosticada debido a sus características especiales. El conocimiento por parte del radiólogo de este tipo de lesiones deriva en un diagnóstico certero y un manejo adecuado.