



# Radiología



## SARCOMAS ABDOMINO-PÉLVICOS DE PARTES BLANDAS: UN TUMOR RARO QUE NO DEBEMOS OLVIDAR

*M. Camargo Montanari, B. Díaz Barroso, C.G. Linares Villavicencio, M.E. Hernández García, F. Cabrera Canal y M.Á. Cruz Díaz*

*Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, España.*

### Resumen

**Objetivos docentes:** Describir e ilustrar las características radiológicas de los sarcomas de partes blandas localizados en abdomen, pelvis y pared abdominal.

**Revisión del tema:** Los sarcomas de tejidos blandos son un grupo de tumores infrecuentes que pueden localizarse en cualquier zona del cuerpo (extremidades, pared torácica, retroperitoneo...) y afectan a todas las edades. En adultos los que se encuentran localizados en abdomen y pelvis se presentan como masas de gran tamaño al diagnóstico, al ser prácticamente asintomáticos. Por el contrario, los que surgen directamente de la pared abdominal causan una masa palpable y se diagnostican antes. Los sarcomas primarios intrabdominales más frecuentes son el liposarcoma, el leiomiomasarcoma y el tumor estromal gastrointestinal. Cualquier sarcoma de partes blandas puede aparecer en la pared abdominal. El 20% de los sarcomas de tejidos blandos no muestran líneas de diferenciación y se clasifican como sarcomas indiferenciados. De estas lesiones la más frecuente es el sarcoma pleomórfico indiferenciado. La localización anatómica, las características de imagen y los hallazgos patológicos de estos tumores son importantes en el diagnóstico diferencial. Sin embargo las imágenes pueden ser poco específicas y superponerse con otras patologías. Se revisan los hallazgos clínicos, radiológicos y patológicos de los diferentes tipos de sarcomas localizados en el abdomen, la pelvis y la pared abdominal, mostrando los casos más representativos de nuestro centro en los últimos 5 años.

**Conclusiones:** Conocer los tipos de sarcomas de tejidos blandos que surgen en la región abdomino-pélvica es importante para establecer un diagnóstico diferencial más preciso y poder aplicar un tratamiento dirigido.